


KISQALI® (ribociclib)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Ribociclib está indicado en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico.

Es un inhibidor de quinasas y puede retardar el crecimiento de las células cancerosas y así retrasar la progresión del cáncer.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Comprimidos color violeta grisáceo claro, sin ranura, redondo, curvado con los bordes biselados, con la impresión «RIC/NVR».

Presentaciones comerciales disponibles: Kisqali® 200 mg comprimidos recubiertos con película.



¿Cómo se debe conservar?

Este medicamento se debe conservar a temperatura ambiente ($T > 25\text{ }^{\circ}\text{C}$) Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

¿Cómo se administra?

Ribociclib se administra por vía oral. Debe tomar la dosis prescrita por su médico. La pauta de inicio habitual de Ribociclib es de 600mg (1 comprimido de 200 mg tres veces al día). Se puede tomar con o sin comida y se recomienda tomar todos los días a la misma hora, preferiblemente por la mañana.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida tomar una dosis, no debe tomar otra adicional, sino esperar a la siguiente dosis y entonces tomarla como de forma habitual. En caso de olvido, no debe duplicar la dosis para compensar el olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?



Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con ribociclib se encuentran: cansancio, alteraciones gastrointestinales (náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea y dolor abdominal), palidez en la piel (bajada de nivel de los glóbulos rojos, anemia), dolor de garganta, rinitis, fiebre, disminución del apetito, dificultad para respirar, dolor de espalda.

Consulte a su médico y farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de ribociclib. Éstos pueden aumentar o disminuir el efecto de ribociclib conduciendo a un aumento de los efectos adversos o haciendo que ribociclib sea menos efectivo, respectivamente.

No tome otro medicamento, suplemento dietético o producto natural (pomelo, hierba de san juan, etc) sin consultar antes con su médico y farmacéutico.

Excipientes de declaración obligatoria

Ninguno

Advertencias

Conducción y uso de máquinas

Lea la sección "Conducción y uso de máquinas" en el prospecto del medicamento y consulte cualquier duda a su médico y farmacéutico.



Embarazo

No debe tomar ribociclib durante el embarazo a menos que se lo haya indicado específicamente su médico.

Lactancia

Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento con ribociclib y hasta 21 semanas después de la última dosis.

Fertilidad

Ribociclib puede alterar la fertilidad en hombres.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**