

Metoject® (Metotrexato)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Metoject es un medicamento antiinflamatorio e inmunosupresor que está indicado para el tratamiento de artritis reumatoide, artritis poliarticular juvenil idiopática, enfermedad de Chron, psoriasis o artritis psoriásica.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles

Metoject 7,5 mg/0,15 ml solución inyectable en jeringa precargada
Metoject 10 mg/0,2 ml solución inyectable en jeringa precargada
Metoject 12,5 mg/0,25 ml solución inyectable en jeringa precargada
Metoject 15 mg/0,3 ml solución inyectable en jeringa precargada
Metoject 17,5 mg/0,35 ml solución inyectable en jeringa precargada
Metoject 20 mg/0,4 ml solución inyectable en jeringa precargada
Metoject 22,5 mg/0,45 ml solución inyectable en jeringa precargada
Metoject 25mg/0,5 ml solución inyectable en jeringa precargada
Metoject 27,5mg/0,55 ml solución inyectable en jeringa precargada
Metoject 30mg/0,6 ml solución inyectable en jeringa precargada



¿Cómo se debe conservar?

Este medicamento se debe conservar en el envase original para protegerlo de la luz y la humedad a una temperatura inferior de 25º C.


¿Cómo se administra?

Siga siempre las indicaciones de su médico.

Se inyecta bajo la piel (vía subcutánea).


Se recomienda sacar de la nevera unos 15-30 minutos antes de administrarse.

Lávese las manos antes de manipular metotrexato.



Los mejores lugares para la inyección son: la parte superior del muslo y el abdomen, salvo el área alrededor del ombligo.

1. Limpie el área que rodea al lugar seleccionado para la inyección con un algodón.
2. Retire el capuchón plástico protector. No toque el émbolo de la aguja mientras retira la tapa.
3. Forme un pliegue en la piel apretando suavemente el área en el lugar de la inyección.



4. Deberá sostenerse el pliegue con los dedos hasta que se haya retirado la jeringa de la piel, tras la aplicación de la inyección. 5. Inserte totalmente la aguja en la piel en un ángulo de 90 grados.

6. Empuje lentamente el émbolo e inyecte el líquido bajo la piel. Retire la jeringa de la piel en el mismo ángulo de 90 grados. El sistema de seguridad del dispositivo permite que la jeringa se retraiga hacia el interior del envase gracias a un muelle quedándose tal y como se muestra en la siguiente figura.



7. Tras la inyección, presione con un algodón o gasa el sitio de inyección durante unos segundos, NO frote.

Cada jeringa precargada es para un único uso. La jeringa se desechará tras la administración en contenedor especial para medicación citotóxica. Evite el contacto con la piel y las mucosas. En caso de contacto accidental, lave la zona con abundante agua.

Para más información vea el video de administración que hemos elaborado para usted.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

En caso de que olvide una dosis, adminístrela tan pronto como sea posible. No se administre una dosis doble para compensar las dosis olvidadas, pero continúe usando la dosis recetada de forma habitual. Consulte a su médico y farmacéutico si tiene dudas.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento se encuentran: fiebre, malestar general, alteraciones gastrointestinales como náuseas, diarrea o pérdida de apetito, dolor de cabeza, somnolencia, alteración del perfil analítico con elevación de enzimas hepáticas (transaminasas) y reacción en el punto de inyección (enrojecimiento, dolor y picor).



Avise a su médico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento, incluidos los adquiridos sin receta y los medicamentos a base de plantas o propios de la medicina natural.



No tome por su cuenta ningún medicamento.

Advertencias

Embarazo:



No debe tomar metotrexato durante el embarazo a menos que se lo haya indicado específicamente su médico. Si pudiera quedarse embarazada durante el tratamiento con metotrexato, debe utilizar un método eficaz de anticoncepción. El metotrexato puede causar anomalías congénitas, perjudicar al feto o producir abortos.

Lactancia:

Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento con metotrexato. Esto se debe a que el principio activo de este medicamento pasa a la leche materna.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**