

Metoject pen[®] (Metotrexato)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Metoject es un medicamento antiinflamatorio e inmunosupresor que está indicado para el tratamiento de artritis reumatoide, artritis poliarticular juvenil idiopática, enfermedad de Chron, psoriasis o artritis psoriásica.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles

Metoject pen 7,5 mg solución inyectable en pluma precargada
Metoject pen 10 mg solución inyectable en pluma precargada
Metoject pen 12,5 mg solución inyectable en pluma precargada
Metoject pen 15 mg solución inyectable en pluma precargada
Metoject pen 17,5 mg solución inyectable en pluma precargada
Metoject pen 20 mg solución inyectable en pluma precargada
Metoject pen 22,5 mg solución inyectable en pluma precargada
Metoject pen 25mg solución inyectable en pluma precargada
Metoject pen 27 mg solución inyectable en pluma precargada
Metoject pen 30 mg solución inyectable en pluma precargada




¿Cómo se debe conservar?

Conservar la jeringa precargada en el embalaje exterior para protegerlas de la luz y a una temperatura menor de 25º C.

¿Cómo se administra?

Se inyecta bajo la piel (vía subcutánea). Se recomienda sacar de la nevera unos 15-30 minutos antes de administrarse. Lávese las manos antes de manipular metotrexato. Los mejores lugares para la inyección son: la parte superior del muslo y el abdomen, salvo el área alrededor del ombligo.




1. Limpie su piel en la zona elegida para la inyección con la toallita impregnada de alcohol incluida.
2. Sujete la pluma precargada Metoject PEN con una mano en el área de manipulación. No quite la tapa antes de estar preparado para administrar la inyección.
3. Utilice la otra mano para tirar de la tapa enseguida. La pequeña cubierta protectora de la aguja sale con la tapa automáticamente. No apriete el botón hasta que esté preparado para la inyección.
4. Con la mano libre, coja un pliegue de piel apretando con cuidado la zona de la piel limpia en el lugar de la inyección. El pliegue se debe mantener pellizcado hasta que la pluma precargada Metoject PEN se haya retirado de la piel después de la inyección.

5. Coloque el extremo transparente sin tapa de la pluma precargada MetojectPEN en un ángulo de 90° sobre la piel y apriete fuerte contra la piel. En ese momento, apriete el botón de la parte superior del dispositivo.



Oirá un clic que indica el inicio de la inyección. Siga sujetando la pluma contra la piel elevada hasta que se haya inyectado todo el medicamento. Esto puede costar hasta 5 segundos.

6. Una vez se ha introducido todo el contenido de la pluma, retire la pluma precargada MetojectPEN del lugar de la inyección, perpendicular a la piel.



7. En ese momento, la cubierta protectora se desplaza automáticamente a su posición sobre la aguja y entonces se bloquea como sistema de seguridad.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

En caso de que olvide una dosis, adminístrela tan pronto como sea posible. No se administre una dosis doble para compensar las dosis olvidadas, pero continúe usando la dosis recetada de forma habitual. Consulte a su médico y farmacéutico si tiene dudas.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento se encuentran: un mayor riesgo de infecciones (se pueden manifestar con fiebre, malestar general, problemas dentales, tos), molestias gastrointestinales como náuseas, pérdida de apetito y diarrea, dolor de cabeza, somnolencia, alteración del perfil analítico con elevación de enzimas hepáticas (transaminasas) y reacciones en el punto de inyección que pueden producir inflamación, dolor, enrojecimiento, picor.

Avise a su médico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento, incluidos los adquiridos sin receta y los medicamentos a base de plantas o propios de la medicina natural.

Es especialmente importante que informe a su médico si está tomando: fenitoína, valproato o carbamazepina; tranquilizantes; anticonceptivos orales; antibióticos; omeprazol; teofilina o cualquier vacuna.

No tome por su cuenta ningún medicamento.

Advertencias

Embarazo:



No debe tomar metotrexato durante el embarazo a menos que se lo haya indicado específicamente su médico. Si pudiera quedarse embarazada durante el tratamiento con metotrexato, debe utilizar un método eficaz de anticoncepción. El metotrexato puede causar anomalías congénitas, perjudicar al feto o producir abortos.

Lactancia:

Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento con metotrexato. Esto se debe a que el principio activo de este medicamento pasa a la leche materna.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS,