

Zejula® (niraparib)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Zejula® es el nombre comercial del medicamento niraparib. Está indicado para el tratamiento de mantenimiento de pacientes adultas con cáncer de ovario epitelial seroso, de las trompas de Falopio o peritoneal primario.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Zejula® 100 mg cápsulas duras. Cápsula dura de aproximadamente 22 mm x 8 mm; cuerpo blanco con "100 mg" impreso con tinta negra y cápsula de cierre morada con "Niraparib" impreso con tinta blanca.

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente.
No conservar a temperatura mayor de 30 °C.

¿Cómo se administra?

Tome niraparib aproximadamente a la misma hora todos los días, con o sin alimentos. Trague las cápsulas enteras, con algo de agua. No mastique ni triture las cápsula.

Se recomienda tomar las cápsulas de niraparib por la noche al acostarse para evitar posibles náuseas.

La dosis inicial recomendada es de 3 cápsulas tomadas juntas, una vez al día (dosis diaria total de 300 mg), aunque la dosis puede variar según indicación médica.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?



No tome otra dosis si olvida su dosis o vomita después de tomar niraparib. Tome la siguiente dosis a la hora programada. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico y farmacéutico

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son: náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, cansancio, fiebre y aparición de hematomas o sangrado durante un tiempo más prolongado de lo habitual si se lastima.

Uso de otros medicamentos

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.

Advertencias

Conducción y uso de máquinas

No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección “Conducción y uso de máquinas”



Embarazo:

Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de niraparib en el embarazo.

Lactancia:

Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento con niraparib tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre.

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO, Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**