

QUIMIOTERÁPICO EN MONOTERAPIA

MANEJO DE LA TERAPIA CON DOCETAXEL

100



Tu
Farmacéutico
de Guardia



¿QUÉ ES?

El esquema de tratamiento que va a recibir es el más adecuado para el estadio de su enfermedad. Se denomina DOCETAXEL 100 y es un fármaco quimioterápico.

Este medicamento se prepara de forma personalizada en el Servicio de Farmacia. Las dosis son individualizadas según sus características personales como su superficie corporal y estado clínico.



¿CÓMO SE ADMINISTRA?

Se administra por vía intravenosa en sesiones o ciclos de dos horas, aproximadamente, cada 21 días y durante 6 ciclos.



CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS



CATEGORÍA I



CATEGORÍA II



CATEGORÍA III

Pueden aparecer reacciones adversas que interfieren en la capacidad para conducir, especialmente durante los primeros días de tratamiento. No conduzca sin consultar con su médico/farmacéutico.



USO DE OTROS MEDICAMENTOS

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado o podría tener que utilizar otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta, a base de plantas medicinales (como Hierba de San Juan), suplementos dietéticos o productos naturales.

Pueden aumentar o disminuir el efecto del tratamiento (aumentando los efectos adversos o reduciendo su efectividad).

MANEJO DE EFECTOS ADVERSOS

POSIBLES EFECTOS DEL TRATAMIENTO	MANEJO
Descenso de glóbulos blancos, plaquetas o anemia.	Para prevenir infecciones: <ul style="list-style-type: none">- vigile su temperatura corporal, si es $> 37,8^{\circ}\text{C}$ acuda a urgencias.- lávese las manos frecuentemente.- avise a su médico si tiene catarro o sensación de quemazón al orinar. Para prevenir hemorragias: <ul style="list-style-type: none">- si se suena la nariz, hágalo de forma suave.- evite el estreñimiento.
Úlceras bucales en la lengua, en los lados de la boca o en la garganta. Úlceras bucales o sangrado de encías que pueden conducir a una infección.	Cepílese los dientes suavemente después de comer y a la hora de acostarse con un cepillo de dientes muy suave. Si sus encías sangran, use una gasa en lugar de un cepillo. Haga un enjuague bucal con el colutorio para mucositis varias veces al día (no tragar). Pruebe alimentos blandos y suaves como los pudines, batidos y sopas de crema.
La pérdida de cabello es común y puede comenzar en un plazo de 3 a 6 semanas después del inicio de tratamiento. Su cabello volverá a crecer una vez termine los tratamientos y a veces entre tratamientos.	Use un champú suave y un cepillo suave. Tenga cuidado con el uso de <i>spray</i> , blanqueadores, tintes y permanentes. Cúbrase la cabeza o aplíquese protector solar en días soleados.
Diarrea.	Beba muchos líquidos (mínimo dos litros de agua o Suero Oral Hiposódico® al día) y siga una dieta astringente. Tome 2 comprimidos de Fortasec® con la primera deposición líquida, y después 1 comprimido tras cada deposición hasta un máximo de 8 comprimidos al día. Si no cede, acuda a urgencias.
Retención de líquidos: tumefacción de pies, manos o vientre, problemas respiratorios, tos, o rápido aumento de peso.	Comuníquese a su médico en su próxima visita. Elevé los pies cuando esté sentado. Evite la ropa ajustada.
Náuseas o vómitos.	Puede tomar Primperan® 10 mg cada 6-8 horas, 10-15 minutos antes de cada comida.
Cambios de las uñas: incluyendo aflojamiento o pérdida de las uñas e hinchazón.	Acuda a su médico si el dolor interfiere con su actividad. De lo contrario, asegúrese de mencionarlo en su próxima visita.
Reacción cutánea mano-pie: las palmas de sus manos y las plantas de sus pies pueden sufrir hormigueo, enrojecimiento, entumecimiento, dolor, o hinchazón. La piel también se puede resecar.	Evite los zapatos ajustados o el roce en las manos y los pies. Evite las joyas ajustadas. Limpié las manos y los pies con agua tibia. Aplíquese un protector solar con un FPS de al menos 30.
Fiebre.	Acuda a URGENCIAS inmediatamente si observa más de $37,8^{\circ}\text{C}$ de temperatura. En las primeras 48 horas puede aparecer febrícula, puede tomar paracetamol 1 g, hasta un máximo de 4 g al día.

Esta información ha sido elaborada por el equipo científico de:

www.tufarmaceticodeguardia.org

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.**

Con la colaboración de:



Mylan

Better Health
for a **Better World**

La responsabilidad sobre los contenidos de esta presentación corresponde única y exclusivamente al equipo científico de "Tu Farmacéutico de guardia", sin que Mylan, como patrocinador, haya participado en su elaboración.