

QUIMIOTERÁPICOS COMBO (2 FÁRMACOS)

MANEJO DE LA TERAPIA CON EC-90



Tu
Farmacéutico
de Guardia



¿QUÉ ES?

El esquema de tratamiento que va a recibir es el más adecuado para el estadio de su enfermedad. Se denomina EC-90 (EPIRUBICINA + CICLOFOSFAMIDA) y es una combinación de dos fármacos quimioterápicos.

Cada medicamento se prepara de forma personalizada en el Servicio de Farmacia. Las dosis son individualizadas según sus características personales como su superficie corporal y estado clínico.



¿CÓMO SE ADMINISTRA?

Se administra por vía intravenosa cada 21 días durante aproximadamente hora y media.



CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS



CATEGORÍA I



CATEGORÍA II



CATEGORÍA III

Pueden aparecer reacciones adversas que interfieren en la capacidad para conducir, especialmente durante los primeros días de tratamiento. No conduzca sin consultar con su médico/farmacéutico.



USO DE OTROS MEDICAMENTOS

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado o podría tener que utilizar otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta, a base de plantas medicinales (como Hierba de San Juan), suplementos dietéticos o productos naturales.

Pueden aumentar o disminuir el efecto del tratamiento (aumentando los efectos adversos o reduciendo su efectividad).

MANEJO DE EFECTOS ADVERSOS

POSIBLES EFECTOS DEL TRATAMIENTO	MANEJO
Descenso de glóbulos blancos, plaquetas o anemia.	<p>Para prevenir infecciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- vigile su temperatura corporal, si es > 37,8 °C acuda a urgencias.- lávese las manos frecuentemente.- avise a su médico si tiene catarro o sensación de quemazón al orinar. <p>Para prevenir hemorragias:</p> <ul style="list-style-type: none">- si se suena la nariz, hágalo de forma suave.- evite el estreñimiento.
Úlceras bucales en la lengua, en los lados de la boca o en la garganta. Úlceras bucales o sangrado de encías que pueden conducir a una infección.	<p>Cepílese los dientes suavemente después de comer y a la hora de acostarse con un cepillo de dientes muy suave. Si sus encías sangran, use una gasa en lugar de un cepillo.</p> <p>Haga un enjuague bucal con colutorio para mucositis varias veces al día (no tragar).</p> <p>Pruebe alimentos blandos y suaves como los pudines, batidos y sopas de crema.</p>
La pérdida de cabello es común y puede comenzar a los pocos días o semanas de tratamiento. El cabello volverá a crecer una vez termine el tratamiento.	<p>Use un champú suave y un cepillo suave.</p> <p>Tenga cuidado con el uso <i>spray</i>, blanqueadores, tintes y permanentes. Cúbrase la cabeza o aplíquese protector solar en días soleados.</p>
Diarrea.	<p>Beba muchos líquidos (mínimo dos litros de agua o Suero Oral Hiposódico® al día) y siga una dieta astringente. Tome 2 comprimidos de Fortasec® con la primera deposición líquida, y después 1 comprimido tras cada deposición hasta un máximo de 8 comprimidos al día. Si no cede, acuda a urgencias.</p>
La orina tendrá color rojo durante 1 a 2 días.	
Náuseas o vómitos.	<p>Puede tomar Primperan® 10 mg cada 6-8 horas, 10-15 minutos antes de cada comida.</p>
Fiebre.	<p>Acuda a URGENCIAS inmediatamente si observa más de 37,8 °C de temperatura. En las primeras 48 horas puede aparecer febrícula, puede tomar paracetamol 1 g, hasta un máximo de 4 g al día.</p>

Esta información ha sido elaborada por el equipo científico de:

www.tufarmaceticodeguardia.org

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.**

Con la colaboración de:



Mylan

Better Health
for a **Better World**

La responsabilidad sobre los contenidos de esta presentación corresponde única y exclusivamente al equipo científico de "Tu Farmacéutico de guardia", sin que Mylan, como patrocinador, haya participado en su elaboración.