

QUIMIOTERÁPICO EN MONOTERAPIA

MANEJO DE LA TERAPIA CON GEM-2



Tu
Farmacéutico
de Guardia



¿QUÉ ES?

El esquema de tratamiento que va a recibir es el más adecuado para el estadio de su enfermedad. Se denomina GEM-2 (GEMCITABINA) y es un fármaco quimioterápico.

Este medicamento se prepara de forma personalizada en el Servicio de Farmacia. Las dosis son individualizadas según sus características personales como su superficie corporal y estado clínico.



¿CÓMO SE ADMINISTRA?

Se administra por vía intravenosa, durante aproximadamente una hora, una vez a la semana, tres semanas seguidas, y la siguiente semana de descanso.



CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS



CATEGORÍA I



CATEGORÍA II



CATEGORÍA III

Pueden aparecer reacciones adversas que interfieren en la capacidad para conducir, especialmente durante los primeros días de tratamiento. No conduzca sin consultar con su médico/farmacéutico.



USO DE OTROS MEDICAMENTOS

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado o podría tener que utilizar otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta, a base de plantas medicinales (como Hierba de San Juan), suplementos dietéticos o productos naturales.

Pueden aumentar o disminuir el efecto del tratamiento (aumentando los efectos adversos o reduciendo su efectividad).

MANEJO DE EFECTOS ADVERSOS

| POSIBLES EFECTOS DEL TRATAMIENTO | MANEJO |
|--|---|
| Descenso de glóbulos blancos, plaquetas o anemia. | Para prevenir infecciones: <ul style="list-style-type: none">- vigile su temperatura corporal, si es > 37,8 °C acuda a urgencias.- lávese las manos frecuentemente.- avise a su médico si tiene catarro o sensación de quemazón al orinar. Para prevenir hemorragias: <ul style="list-style-type: none">- si se suena la nariz, hágalo de forma suave.- evite el estreñimiento. |
| Sarpullido cutáneo. Por lo general es leve y se encuentra en los brazos, piernas, pecho, espalda o estómago. Puede o no tener picazón. | Aplíquese crema de hidrocortisona al 0,5% de 3 a 4 veces al día. |
| La pérdida de cabello es común y puede comenzar a los pocos días o semanas de tratamiento. El cabello volverá a crecer una vez termine el tratamiento. | Use un champú suave y un cepillo suave. Tenga cuidado con el uso de <i>spray</i> , blanqueadores, tintes y permanentes. Cúbrase la cabeza o aplíquese protector solar en días soleados. |
| Diarrea. | Beba muchos líquidos (mínimo dos litros de agua o Suero Oral Hiposódico® al día) y siga una dieta astringente. Tome 2 comprimidos de Fortasec® con la primera deposición líquida, y después 1 comprimido tras cada deposición hasta un máximo de 8 comprimidos al día. Si no cede, acuda a urgencias. |
| Síntomas similares a la gripe. Es posible que tenga fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares. | Fiebre y escalofríos. Si ocurren más de 48 horas después del tratamiento, pueden ser signos de una infección. Acuda a su médico inmediatamente. |
| Náuseas o vómitos. | Puede tomar Primperan® 10 mg cada 6-8 horas, 10-15 minutos antes de cada comida. |
| Fiebre. | Acuda a URGENCIAS inmediatamente si observa más de 37,8 °C de temperatura. En las primeras 48 horas puede aparecer febrícula, puede tomar paracetamol 1 g, hasta un máximo de 4 g al día. |

Esta información ha sido elaborada por el equipo científico de:

www.tufarmaceticodeguardia.org

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.**

Con la colaboración de:



Mylan

Better Health
for a **Better World**

La responsabilidad sobre los contenidos de esta presentación corresponde única y exclusivamente al equipo científico de "Tu Farmacéutico de guardia", sin que Mylan, como patrocinador, haya participado en su elaboración.