

ANTICUERPO MONOCLONAL

MANEJO DE LA TERAPIA CON NIVOLUMAB



Tu
Farmacéutico
de Guardia



¿QUÉ ES?

El esquema de tratamiento que va a recibir es el más adecuado para el estadio de su enfermedad. Se denomina NIVOLUMAB y es un anticuerpo monoclonal.

Cada medicamento se prepara de forma personalizada en el Servicio de Farmacia. Las dosis son individualizadas según sus características personales como su superficie corporal y estado clínico.



¿CÓMO SE ADMINISTRA?

Mediante una perfusión intravenosa (según indicación) cada dos o cuatro semanas durante 60 minutos.



CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS



CATEGORÍA I



CATEGORÍA II



CATEGORÍA III

Pueden aparecer reacciones adversas que interfieren en la capacidad para conducir, especialmente durante los primeros días de tratamiento. No conduzca sin consultar con su médico/farmacéutico.



USO DE OTROS MEDICAMENTOS

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado o podría tener que utilizar otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta, a base de plantas medicinales (como Hierba de San Juan), suplementos dietéticos o productos naturales.

Pueden aumentar o disminuir el efecto del tratamiento (aumentando los efectos adversos o reduciendo su efectividad).

MANEJO DE EFECTOS ADVERSOS

POSIBLES EFECTOS DEL TRATAMIENTO	MANEJO
Reacciones alérgicas: enrojecimiento y erupción cutánea, hinchazón o problemas respiratorios.	Pueden ocurrir inmediatamente u horas después del tratamiento. Comuníquese a su enfermera si pasa mientras está recibiendo nivolumab o contacte con su oncólogo si ocurre después de abandonar el hospital.
Dolor o entumecimiento en el lugar de la inyección.	Aplíquese compresas frías en la zona 15-20 minutos varias veces al día.
Descenso de glóbulos blancos, plaquetas o anemia.	Para prevenir infecciones: <ul style="list-style-type: none">- vigile su temperatura corporal, si es > 37,8 °C acuda a urgencias.- lávese las manos frecuentemente.- avise a su médico si tiene catarro o sensación de quemazón al orinar. Para prevenir hemorragias: <ul style="list-style-type: none">- si se suena la nariz, hágalo de forma suave.- evite el estreñimiento.
Diarrea.	Beba muchos líquidos (mínimo dos litros de agua o Suero Oral Hiposódico® al día) y siga una dieta astringente. Tome 2 comprimidos de Fortasec® con la primera deposición líquida, y después 1 comprimido tras cada deposición hasta un máximo de 8 comprimidos al día. Si no cede, acuda a urgencias.
Náuseas o vómitos.	Puede tomar Primperan® 10 mg cada 6-8 horas, 10-15 minutos antes de cada comida.
Mareo y cefalea, y pérdida de peso y apetito.	Consulte con su médico.
Fiebre.	Acuda a URGENCIAS inmediatamente si observa más de 37,8 °C de temperatura. En las primeras 48 horas puede aparecer febrícula, puede tomar paracetamol 1 g, hasta un máximo de 4 g al día.

Esta información ha sido elaborada por el equipo científico de:

www.tufarmaceticodeguardia.org

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.**

Con la colaboración de:



Mylan

Better Health
for a **Better World**

La responsabilidad sobre los contenidos de esta presentación corresponde única y exclusivamente al equipo científico de "Tu Farmacéutico de guardia", sin que Mylan, como patrocinador, haya participado en su elaboración.