

QUIMIOTERÁPICO EN MONOTERAPIA

# MANEJO DE LA TERAPIA CON OXALIPLATINO



Tu  
Farmacéutico  
de Guardia



## ¿QUÉ ES?

El esquema de tratamiento que va a recibir es el más adecuado para el estadio de su enfermedad. Se denomina OXALIPLATINO y es un fármaco quimioterápico.

Cada medicamento se prepara de forma personalizada en el Servicio de Farmacia. Las dosis son individualizadas según sus características personales como su superficie corporal y estado clínico.



## ¿CÓMO SE ADMINISTRA?

Se administra por vía intravenosa cada 21 días, en dos horas y media aproximadamente.



## CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS



CATEGORÍA I



CATEGORÍA II



CATEGORÍA III

Pueden aparecer reacciones adversas que interfieren en la capacidad para conducir, especialmente durante los primeros días de tratamiento. No conduzca sin consultar con su médico/farmacéutico.



## USO DE OTROS MEDICAMENTOS

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado o podría tener que utilizar otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta, a base de plantas medicinales (como Hierba de San Juan), suplementos dietéticos o productos naturales.

Pueden aumentar o disminuir el efecto del tratamiento (aumentando los efectos adversos o reduciendo su efectividad).

# MANEJO DE EFECTOS ADVERSOS

POSIBLES EFECTOS DEL TRATAMIENTO	MANEJO
<p>Neuropatía periférica: la exposición al frío con frecuencia desencadena entumecimiento, hormigueo y calambres en las manos o en los pies. Este síntoma por lo general disminuye o desaparece entre los tratamientos; sin embargo, a medida que aumenta el número de tratamientos, el entumecimiento y el hormigueo tardan más en disminuir o en desaparecer.</p>	<p>Evite el aire frío. Protéjase del frío, que empeora estos síntomas. No beba bebidas frías o comida fría durante unos días después del tratamiento. Si los síntomas continúan por más de una semana, o interfiere en su vida diaria, consulte con su médico.</p>
<p>Descenso de glóbulos blancos, plaquetas o anemia.</p>	<p><b>Para prevenir infecciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vigile su temperatura corporal, si es &gt; 37,8 °C acuda a urgencias.</li><li>- lávese las manos frecuentemente.</li><li>- avise a su médico si tiene catarro o sensación de quemazón al orinar.</li></ul> <p><b>Para prevenir hemorragias:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- si se suena la nariz, hágalo de forma suave.</li><li>- evite el estreñimiento.</li></ul>
<p>Diarrea.</p>	<p>Beba muchos líquidos (mínimo dos litros de agua o Suero Oral Hiposódico® al día) y siga una dieta astringente. Tome 2 comprimidos de Fortasec® con la primera deposición líquida, y después 1 comprimido tras cada deposición hasta un máximo de 8 comprimidos al día. Si no cede, acuda a urgencias.</p>
<p>Náuseas o vómitos.</p>	<p>Puede tomar Primperan® 10 mg cada 6-8 horas, 10-15 minutos antes de cada comida.</p>
<p>Fiebre.</p>	<p>Acuda a <b>URGENCIAS</b> inmediatamente si observa más de 37,8 °C de temperatura. En las primeras 48 horas puede aparecer febrícula, puede tomar paracetamol 1 g, hasta un máximo de 4 g al día.</p>

Esta información ha sido elaborada por el equipo científico de:

[www.tufarmaceticodeguardia.org](http://www.tufarmaceticodeguardia.org)

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,  
solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.**

---

Con la colaboración de:



**Mylan**

**Better Health**  
*for a* **Better World**

La responsabilidad sobre los contenidos de esta presentación corresponde única y exclusivamente al equipo científico de "Tu Farmacéutico de guardia", sin que Mylan, como patrocinador, haya participado en su elaboración.