

QUIMIOTERÁPICOS COMBO (2 FÁRMACOS)

# MANEJO DE LA TERAPIA CON TAXOL-CARBO



Tu  
Farmacéutico  
de Guardia



## ¿QUÉ ES?

El esquema de tratamiento que va a recibir es el más adecuado para el estadio de su enfermedad. Se denomina TAXOL-CARBO (PACLITAXEL + CARBOPLATINO) y es una combinación de dos fármacos quimioterápicos.

Cada medicamento se prepara de forma personalizada en el Servicio de Farmacia. Las dosis son individualizadas según sus características personales como su superficie corporal y estado clínico.



## ¿CÓMO SE ADMINISTRA?

Se administra por vía intravenosa, durante cinco horas aproximadamente, cada 21 días.



## CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS



CATEGORÍA I



CATEGORÍA II



CATEGORÍA III

Pueden aparecer reacciones adversas que interfieren en la capacidad para conducir, especialmente durante los primeros días de tratamiento. No conduzca sin consultar con su médico/farmacéutico.



## USO DE OTROS MEDICAMENTOS

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado o podría tener que utilizar otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta, a base de plantas medicinales (como Hierba de San Juan), suplementos dietéticos o productos naturales.

Pueden aumentar o disminuir el efecto del tratamiento (aumentando los efectos adversos o reduciendo su efectividad).

# MANEJO DE EFECTOS ADVERSOS

POSIBLES EFECTOS DEL TRATAMIENTO	MANEJO
Reacciones alérgicas: pueden incluir rubor, mareos, problemas respiratorios, latidos cardíacos rápidos o irregulares, o dolor en el pecho.	Puede ocurrir inmediatamente o varias horas después. Comuníquese a su enfermera si esto sucede mientras está recibiendo carboplatino o acuda a urgencias de inmediato si esto ocurre después de salir del hospital.
Descenso de glóbulos blancos, plaquetas o anemia.	<b>Para prevenir infecciones:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- vigile su temperatura corporal, si es &gt; 37,8 °C acuda a urgencias.</li><li>- lávese las manos frecuentemente.</li><li>- avise a su médico si tiene catarro o sensación de quemazón al orinar.</li></ul> <b>Para prevenir hemorragias:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- si se suena la nariz, hágalo de forma suave.</li><li>- evite el estreñimiento.</li></ul>
Úlceras bucales en la lengua, en los lados de la boca o en la garganta. Úlceras bucales o sangrado de encías que pueden conducir a una infección.	Cepílese los dientes suavemente después de comer y a la hora de acostarse con un cepillo de dientes muy suave. Si sus encías sangran, use una gasa en lugar de un cepillo. Haga un enjuague bucal con el colutorio de mucositis y enjuague varias veces al día (no tragar) Pruebe alimentos blandos y suaves como los pudines, batidos y sopas de crema.
La pérdida de cabello es común y puede comenzar a los pocos días o semanas de tratamiento. Su cabello volverá a crecer una vez termine el tratamiento.	Use un champú suave y un cepillo suave. Tenga cuidado con el uso de <i>spray</i> , blanqueadores, tintes y permanentes. Cúbrase la cabeza o aplíquese protector solar en días soleados.
Entumecimiento u hormigueo en los dedos. Esto regresará lentamente a la normalidad una vez que sus tratamientos han terminado. Esto puede durar varios meses.	Tenga cuidado al manipular artículos punzantes, calientes o fríos. Comuníquese a su médico en su próxima visita, especialmente si tiene problemas escribiendo o cogiendo pequeños objetos.
Diarrea.	Beba muchos líquidos (mínimo dos litros de agua o Suero Oral Hiposódico® al día) y siga una dieta astringente. Tome 2 comprimidos de Fortasec® con la primera deposición líquida, y después 1 comprimido tras cada deposición hasta un máximo de 8 comprimidos al día. Si no cede, acuda a urgencias.
Náuseas o vómitos.	Puede tomar Primperan® 10 mg cada 6-8 horas, 10-15 minutos antes de cada comida.
Fiebre.	Acuda a <b>URGENCIAS</b> inmediatamente si observa más de 37,8 °C de temperatura. En las primeras 48 horas puede aparecer febrícula, puede tomar paracetamol 1 g, hasta un máximo de 4 g al día.

Esta información ha sido elaborada por el equipo científico de:

[www.tufarmaceuticodeguardia.org](http://www.tufarmaceuticodeguardia.org)

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,  
solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.**

---

Con la colaboración de:



**Mylan**

**Better Health**  
*for a* **Better World**

La responsabilidad sobre los contenidos de esta presentación corresponde única y exclusivamente al equipo científico de "Tu Farmacéutico de guardia", sin que Mylan, como patrocinador, haya participado en su elaboración.