

# **Juluca®** **(dolutegravir/rilpivirina)**



## ***¿Qué es y para qué se utiliza?***

Juluca® es un medicamento antivírico que contiene dolutegravir y rilpivirina. Se utiliza para tratar el virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1 (VIH 1) en adultos cuya infección por el VIH-1 esté bajo control desde hace más de 6 meses.

## ***Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital***

Juluca® está compuesto por 50 mg de dolutegravir y 25 mg de rilpivirina. Comprimido recubierto con película rosas, ovalados, biconvexos, de aproximadamente 14 x 7 mm, grabados con "SV J3T" en una cara.

## ***¿Cómo se debe conservar?***

Conservar en el envase original a temperatura ambiente para protegerlo de la humedad, la luz y el calor. Mantener el frasco perfectamente cerrado.

## ***¿Cómo se administra?***

Debe tomar la dosis prescrita por su médico. La dosis recomendada habitualmente de Juluca® es de un comprimido una vez al día junto con la comida. El comprimido no se debe triturar, fraccionar ni masticar.



## ***¿Qué hacer si se olvida una dosis?***

Si olvida una dosis de Juluca® y se da cuenta en el plazo de 12 horas, debe tomarlo antes posible con algún alimento y continuar con su pauta habitual de administración.

Si olvida una dosis de Juluca® y se da cuenta en más de 12 horas y es casi la hora de su siguiente dosis, no debe tomar la dosis omitida y simplemente debe continuar la pauta habitual de administración.

## ***¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?***

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento destacan: diarrea, náuseas, dolor de cabeza, insomnio, erupción cutánea, alteraciones analíticas en el perfil hepático.

Consulte a su médico y farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

## ***Uso de otros medicamentos***

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que toma. Recuerde informar a su médico y farmacéutico si empieza a tomar un nuevo medicamento o producto medicinal mientras está tomando Juluca®. Algunos medicamentos pueden interferir con el efecto de Juluca® y puede producir efectos adversos indeseados o disminuir la efectividad del tratamiento.

No tome zumo de pomelo o hierba de San Juan (hipérico) durante el tratamiento.

## ***Excipientes de declaración obligatoria***

Contiene lactosa monohidrato.

### **Advertencias**

Debe tener especial precaución si tiene historial de insuficiencia renal, hepática o hemofilia. También si es diabético, tiene el colesterol alto, sobrepeso y/o alérgico a sulfamidas.

### **Conducción y uso de máquinas**

No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección “Conducción y uso de máquinas”



### **Embarazo**

No debe tomar Juluca® durante el embarazo a menos que se lo haya indicado específicamente su médico. Si pudiera quedarse embarazada durante el tratamiento con Juluca®, debe utilizar un método eficaz de anticoncepción.

Si se queda embarazada, o planea quedarse embarazada, pregunte a su médico acerca de los riesgos y beneficios potenciales de su terapia antirretroviral para usted y para su hijo.

### **Lactancia:**

Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento con Juluca®. Esto se debe a que el principio activo de este medicamento pasa a la leche materna.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,  
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS,  
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**