

Ocaliva® (ácido obeticólico)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Ocaliva® está indicado para el tratamiento de adultos con colangitis biliar primaria (o cirrosis biliar primaria) en combinación con el ácido ursodesoxicólico. También se puede utilizar en monoterapia en pacientes que no toleren el ácido ursodesoxicólico.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Presentaciones comerciales disponibles:

Ocaliva® 5 mg comprimidos recubiertos con película

Ocaliva® 10 mg comprimidos recubiertos con película

¿Cómo se debe conservar?

Este medicamento se debe conservar en el envase original para protegerlo de la luz y la humedad.

¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico. Usted debe tragar los comprimidos enteros y evitar triturarlos. Puede tomar los comprimidos con o sin alimentos.

Debe tener en cuenta que si usted está siendo tratado con resinas secuestradoras de ácidos biliares, debe tomar el ácido obeticólico al menos de 4 a 6 horas antes o de 4 a 6 horas después de haber tomado dichas resinas.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida tomar una dosis, sátese la dosis olvidada y siga su tratamiento de forma habitual. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento se encuentran: dolor de estómago, sensación de cansancio (astenia), prurito y erupción en la piel.

Consulte a su médico y farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de ácido obeticólico. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico y farmacéutico.

Advertencias

Embarazo:



No debe tomar ácido obeticólico durante el embarazo a menos que se lo haya indicado específicamente su médico. Si pudiera quedarse embarazada durante el tratamiento con ácido obeticólico, debe utilizar un método eficaz de anticoncepción.

Lactancia:

Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento con ácido obeticólico. Esto se debe a que el principio activo de este medicamento pasa a la leche materna.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**