

# **Simponi<sup>®</sup> (Golimumab)**

## ***¿Qué es y para qué se utiliza?***

Simponi está indicado para el tratamiento de la artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante y colitis ulcerosa.

## ***Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital***

Simponi 50 mg solución inyectable en pluma precargada.

Simponi 100 mg solución inyectable en pluma precargada.

## ***¿Cómo se debe conservar?***

Guarde Simponi en la nevera, entre 2°C y 8°C (NUNCA en el congelador) y dentro de su caja para protegerlo de la luz.

## ***¿Cómo se administra?***

Se administra vía subcutánea (bajo la piel). Se recomienda sacar de la nevera al menos 30 min antes de administrarse.

Siga las instrucciones de su médico. La dosis puede variar según patología y el peso del paciente, siendo la dosis habitual de mantenimiento de 100 o 50 mg (una inyección) cada 30 días durante el tiempo que le indique su médico. En los pacientes con colitis ulcerosa se debe iniciar el tratamiento con una dosis inicial de 200 mg, seguido de 100 mg en la semana 2, y continuar con la dosis mensual correspondiente.

- Lávese las manos antes de manipular Simponi. La pluma se presenta lista para administrar, contiene una solución incolora y transparente o ligeramente opalescente.
- Limpie la zona de inyección con una toallita impregnada de alcohol. Espere a que se evapore el alcohol antes de la inyección. Las zonas de inyección son el abdomen y los muslos. Nunca pinche en una zona enrojecida, dañada o endurecida.
- Píñchese cada vez en un lugar distinto a al menos a 3 cm de la zona de la última inyección. Si son necesarias varias inyecciones a la vez, deberán administrarse en diferentes zonas del cuerpo.
- Tras la inyección, presione con un algodón o gasa el sitio de inyección durante unos segundos, NO frote.
- Cada pluma es de un solo uso.

***Para más información consulte el video de administración que hemos elaborado para usted.***

## ***¿Qué hacer si se olvida una dosis?***

Si la dosis se ha retrasado menos de 2 semanas, debe inyectarse la dosis olvidada tan pronto como sea posible y mantener su calendario original (como si no hubiera olvidado una dosis). Si la dosis se ha retrasado más de 2 semanas, el paciente debe inyectarse la dosis olvidada y se debe establecer un nuevo calendario a partir de la fecha de esta inyección.

## ***¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?***

Son frecuentes las reacciones locales en el punto de inyección (enrojecimiento, picor, dolor e inflamación). Pueden sobrevenir infecciones, dolor de cabeza, erupción, anemia... Comunique a su médico la aparición de erupción severa, urticaria, llagas en la garganta, ampollas, hinchazón de la cara, manos y pies, dificultad para respirar y tragar.

Los signos de infección como fiebre, malestar, debilidad, heridas, problemas dentales, dolor al orinar, cansancio, pérdida de peso, tos, hormigueo, visión doble, etc... también se deben comunicar a su médico.

Avise a su médico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

## ***Uso de otros medicamentos***

Simponi puede administrarse solo o junto con metotrexate, o con algunos otros fármacos antirreumáticos como son sulfasalazina o hidroxycloquina, también con corticoides o medicamentos para el dolor como los analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos. No tome por su cuenta ningún medicamento.

**Advertencias**

No se recomienda la administración de golimumab durante el embarazo (solo en caso de que fuese estrictamente necesario). A las mujeres en edad fértil se les recomienda utilizar un método anticonceptivo adecuado para prevenir el embarazo y continuar su uso durante al menos seis meses tras el último tratamiento con Simponi.

Algunas vacunas están contraindicadas durante el tratamiento, consulte al médico antes de ser vacunado.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,  
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,  
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**