

Tasigna® (Nilotinib)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Tasigna® actúa inhibiendo el crecimiento de las células anormales en la leucemia mieloide crónica cromosoma Filadelfia positivo.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Tasigna® 150 mg cápsulas duras

Cápsulas duras, opacas, de color rojo, con la impresión «NVR/BCR» en negro.

Tasigna® 200 mg cápsulas duras

Cápsulas de gelatina dura, opacas, de color amarillo claro, con la impresión «NVR/TKI» en rojo.

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30°C).

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

¿Cómo se administra?

La dosis recomendada de inicio de Tasigna® es de 300mg o 400mg dos veces al día. Debe tomar la dosis prescrita por su médico.

El tratamiento debe prolongarse mientras continúe el beneficio para el paciente.

Las cápsulas duras deben tragarse enteras, con agua.

No se debe ingerir alimentos durante las dos horas previas a la administración de la dosis ni durante, al menos, una hora después.



Para pacientes que no puedan tragar las cápsulas duras, el contenido de cada cápsula dura puede dispersarse en una cucharadita de compota de manzana (puré de manzana) y debe tomarse inmediatamente.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?



Si el paciente olvida tomar una dosis, no debe tomar una dosis adicional, sino esperar a la siguiente dosis, según la pauta establecida.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Tasigna® son: erupción, picor, dolor de cabeza, náuseas, estreñimiento, diarrea, fatiga, alopecia, dolor muscular y dolor abdominal

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta (como paracetamol) e incluso los medicamentos a base de plantas medicinales (como Hierba de San Juan).

Éstos pueden aumentar o disminuir el efecto de Tasigna® conduciendo a un aumento de los efectos adversos o haciendo que Tasigna® sea menos efectivo.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa

Advertencias



Embarazo:

No está recomendado el uso de Tasigna® durante el embarazo. Se recomienda a las mujeres que pudiesen quedarse embarazadas que utilicen un método anticonceptivo efectivo durante el tratamiento.

Lactancia: No dé el pecho a su bebé durante el tratamiento con Tasigna®

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**