

## COLIRIO DE SUERO AUTÓLOGO 20%

### **¿Qué es y para qué se utiliza?**

Colirio utilizado para el tratamiento de patologías como defectos epiteliales, ojo seco grave, erosiones corneales o cirugías de reconstrucción de la superficie ocular. Es una fórmula magistral elaborada en el Servicio de Farmacia, específicamente para cada paciente, a partir de suero autólogo y solución de irrigación.

### **Nombres y presentaciones disponibles en nuestro hospital**

Colirio de suero autólogo 20% (frasco de 5ml).

Líquido de color amarillento envasado en frascos con gotero de plástico transparente o blanco. Cada frasco dispone de una etiqueta en la que se refleja: nombre de paciente, composición, nºrecetario, fecha de elaboración/caducidad, condiciones de conservación y caducidad.

### **¿Cómo se administra?**

Lávese las manos y agite suavemente el colirio. No toque el gotero ni lo ponga en contacto con su ojo.

Sujete el párpado inferior y ponga el gotero justo por encima del ojo sin tocarlo.

Administre la dosis prescrita por su médico.

Una vez administrado el colirio parpadear para que el medicamento se distribuya bien por todo el ojo.

Cierre los ojos durante 1-2 minutos y limpie con una gasa estéril el exceso de colirio sin frotar los ojos.

Si tiene otro tratamiento ocular espere al menos 5 minutos entre administraciones.



### **Conservación**

Conservar protegido de la luz y en nevera (entre 2-4 °C).

Se dispensan en el Servicio de Farmacia normalmente 4 unidades para una duración aproximada de 28 días.

Abrir sólo un colirio cada semana. Una vez abierto, el periodo de validez es de 7 días conservado en nevera. Al séptimo día desecharlo y abrir un colirio nuevo.

### **¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?**

En pacientes sensibles pueden aparecer síntomas como irritación, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño o picor en el párpado. Debe comunicarlo al médico si detecta que alguno de estos síntomas persiste.

### **Caducidad**

Un mes a partir de la fecha de elaboración que aparece en el envase si este permanece cerrado. **Si el envase se abre, el periodo de validez es de 7 días, manteniéndolo en la nevera.**

### **Advertencias**

No utilizar en caso de alergia al medicamento o alguno de sus excipientes.

- **Conducción y uso de máquinas:** puede causar visión borrosa. Durante ese tiempo, no debe conducir vehículos o manipular maquinaria peligrosa.

- **Embarazo y lactancia:** no debe utilizarse sin consultarlo con su médico o farmacéutico.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Este colirio es de uso personal. No debe ser administrado a ninguna otra persona.