

ENDORET®

¿Qué es y para qué se utiliza?

Colirio para el tratamiento de trastornos de la superficie ocular, como sequedad, úlceras corneales y defectos epiteliales. Es una fórmula magistral que se elabora en el Servicio de Farmacia, específicamente **para cada paciente, a partir de suero autólogo**.

Nombres y presentaciones disponibles en nuestro hospital

Colirio de Endoret®, envasado en 30 dispensadores de 0,6 ml cada uno, colocados en una gradilla. Esta gradilla y un porta-dispensador se guardan en una bolsa protectora.



Gradilla con 30 dispensadores



Porta-dispensador

¿Cómo transportarlo y almacenarlo?

Durante el transporte desde el Servicio de Farmacia hasta su hogar, el colirio debe estar a una temperatura entre 2-8°C. Cuando llegue a casa, almacénelo en congelador a -20°C.

¿Cómo se administra?

Es necesario que saque un dispensador del congelador y lo ponga en la nevera dentro del porta-dispensador, unas 8 horas antes del uso para que el colirio se descongele. Lávese las manos antes de abrir el dispensador. Asegúrese de que la punta del vial no entra en contacto con ninguna superficie. Baje el párpado inferior y aplique el número de gotas indicadas por su médico. Cierre el dispensador después de cada uso y dépositelo dentro del porta-dispensador.

Una vez administrado el colirio parpadear para que el medicamento se distribuya bien por todo el ojo.

Durante el tratamiento, se recomienda mantener refrigerado (2-8°C) el dispensador que está utilizando, aunque si no fuera posible se puede conservar a temperatura ambiente. Una vez se ha abierto el dispensador, se puede utilizar durante 72 horas.



Eliminación

Cada dispensador se puede usar durante un periodo máximo de 3 días. Al finalizar el tercer día de uso, debe desechar el dispensador como si se tratara de residuos orgánicos convencionales. No tire el porta-dispensador.



Dispensador vacío

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Molestia o sensación de quemazón en el ojo, intolerancia a la luz o hinchazón. Consulte con su médico o farmacéutico si experimenta cualquiera de estas alteraciones.

Caducidad

Tres meses congelado. Tres días (72 h) una vez el colirio se descongela.

Advertencias

No utilizar en caso de alergia al medicamento o alguno de sus excipientes.

Conducción y uso de máquinas: puede causar visión borrosa. Durante ese tiempo, no debe conducir vehículos o manipular maquinaria peligrosa.

Embarazo y lactancia: no debe utilizarlo sin consultarlo con su médico o farmacéutico.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Este colirio es de uso personal. No debe ser administrado a ninguna otra persona