

COLIRIO DE VANCOMICINA 50mg/ml

¿Qué es y para qué se utiliza?

Colirio antibiótico, indicado para tratar infecciones oculares, como queratitis y endoftalmitis bacterianas. Es una fórmula magistral, elaborada a partir de vancomicina y suero fisiológico en el Servicio de Farmacia, específicamente para cada paciente.

Nombres y presentaciones disponibles en nuestro hospital

Colirio de vancomicina 50 mg/ml (frasco de 5ml).

Líquido transparente envasado en frascos con gotero de plástico transparente o blanco. Cada frasco dispone de una etiqueta en la que se refleja: composición, nºrecetario, fecha de elaboración/caducidad y condiciones de conservación.

¿Cómo se administra?

Lávese las manos y agite suavemente el colirio. No toque el gotero ni lo ponga en contacto con su ojo.

Sujete el párpado inferior y ponga el gotero justo por encima del ojo sin tocarlo. Administre la dosis prescrita por su médico.

Una vez administrado el colirio parpadee para que el medicamento se distribuya bien por todo el ojo.

Cierre los ojos durante 1-2 minutos y limpie con una gasa estéril el exceso del colirio sin frotar los ojos.

Si tiene otro tratamiento ocular, espere al menos 5 minutos entre cada administración.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida una dosis, adminístrela tan pronto como se acuerde. Luego continúe la administración como antes. No se administre una dosis doble para compensar un olvido.

Conservación

Conservar en nevera (2-8°C) y protegido de la luz.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Pueden aparecer síntomas como lagrimeo, sensación de cuerpo extraño o picor en el párpado. Debe comunicarlo al médico si detecta que alguno de estos síntomas persiste.

Caducidad

15 días a partir de la fecha de elaboración que aparece en el envase cerrado.

Una vez abierto, el periodo de validez es de 7 días en nevera (2-8 °C).

Advertencias

No utilizar en caso de alergia al medicamento o alguno de sus excipientes.

- **Conducción y uso de máquinas:** puede causar visión borrosa. Durante ese tiempo, no debe conducir vehículos o manipular maquinaria peligrosa.

- **Embarazo y lactancia:** no debe utilizarse sin consultarlo con su médico o farmacéutico.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Este colirio es de uso personal. No debe ser administrado a ninguna otra persona.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE A LAS INDICACIONES DE SU OFTALMÓLOGO
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**