

Xeljanz®(Tofacitinib)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Xeljanz® está indicado para el tratamiento de la artritis reumatoide activa de moderada a grave en pacientes adultos con respuesta inadecuada o intolerancia a uno o más fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Xeljanz® se puede utilizar en monoterapia o en combinación con metotrexato. También se puede utilizar para el tratamiento de artritis psoriásica y colitis ulcerosa activa de moderada a grave para pacientes con pérdida de respuesta o intolerante al tratamiento convencional o biológico.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Xeljanz® 5 mg comprimidos recubiertos con película.

Comprimido blanco redondo con "Pfizer" grabado en una cara y "JKI 5" en la otra

Xeljanz® 10 mg comprimidos recubiertos con película.

Comprimido azul redondo con "Pfizer" grabado en una cara y "JKI 10" en la otra

¿Cómo se debe conservar?

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación (sin pasar los 30°C).

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el blíster y en la caja después de CAD.

¿Cómo se administra?

Xeljanz® se administra vía oral. Tome la dosis prescrita por su médico.

La dosis recomendada para artritis reumatoide es de 5 mg administrados dos veces al día.

La dosis recomendada para colitis ulcerosa es de 10 mg administrados dos veces al día por vía oral para la inducción durante 8 semanas, y de 5 mg administrados dos veces al día como mantenimiento.

Xeljanz® se puede tomar con o sin alimentos en cualquier momento del día.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Tome el siguiente comprimido a la hora habitual y continúe como antes.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Son frecuentes infecciones pulmonares (neumonía y bronquitis), gripe, sinusitis, infección de la vejiga urinaria (cistitis), dolor de garganta (faringitis), aumento de enzimas hepáticas o de enzimas musculares en sangre o aumento del colesterol, aumento de peso, dolor de estómago, vómitos, diarrea, náuseas, indigestión, dolor en los músculos y articulaciones, anemia, fiebre, cansancio, hinchazón de pies y manos, dolor de cabeza, hipertensión, falta de aliento o dificultad para respirar, tos, erupción cutánea.

Avise a su médico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento.

Excipientes:

Contiene lactosa

Advertencias

Precauciones

El uso de tofacitinib se asocia a un incremento de riesgo de tromboembolismo venoso en pacientes con factores de riesgo tromboembólicos y este aumento de riesgo es dosis-dependiente.

Tofacitinib debe utilizarse con precaución en pacientes con factores de riesgo para, tromboembolismo venoso independiente de la indicación terapéutica.

En pacientes de 65 años o mayores, el tratamiento con tofacitinib (cualquier dosis) debe emplearse únicamente cuando no haya otra alternativa terapéutica.

Conducción y uso de máquinas

No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección "Conducción y uso de máquinas"



Embarazo

Debe utilizar un método anticonceptivo efectivo para evitar quedarse embarazada durante el tratamiento con Xeljanz® y al menos durante una semana tras finalizar el tratamiento con Xeljanz®. Debe informar a su médico si se queda embarazada ya que Xeljanz® no se debe utilizar durante el embarazo.

Lactancia:

No debe utilizar Xeljanz® durante la lactancia ya que se desconoce si este medicamento pasa a la leche materna. Usted y su médico deben decidir si dará el pecho o tomará Xeljanz®.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**