

Imraldi® (Adalimumab)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Imraldi® está indicado en el tratamiento de la artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, espondilitis anquilosante, espondiloartritis axial, artritis psoriásica, psoriasis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, hidradenitis supurativa y uveítis. Es un medicamento que disminuye el proceso de inflamación asociado a estas enfermedades.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Imraldi® 40 mg solución inyectable en jeringa precargada

Imraldi® 40 mg solución inyectable en pluma precargada

¿Cómo se debe conservar?

Adalimumab debe conservarse en nevera (2°C – 8°C). No congelar. Debe conservar la jeringa precargada en el embalaje original para protegerla de la luz. No deseche la jeringa en el contenedor domiciliario sino en el que se le proporcione en la farmacia.

¿Cómo se administra?

Siga las indicaciones de su médico.

Se inyecta bajo la piel (vía subcutánea). La dosis inicial puede variar según patología, siendo la dosis habitual de mantenimiento de 40 mg (una inyección) cada dos semanas:

Diagnostico	Dosis inicial	Dosis de mantenimiento
Artritis reumatoide	40 mg cada dos semanas	
Espondilitis anquilosante, espondiloartritis axial y artritis psoriásica	40 mg cada dos semanas	
Psoriasis y uveítis	80mg en semana 0 40mg en semana 1	40 mg cada dos semanas
Enfermedad de Crohn	80mg o 160mg en semana 0 40mg o 80mg en semana 2	40 mg cada dos semanas
Colitis ulcerosa	160mg en semana 0 80mg en semana 2	40 mg cada dos semanas
Hidradenitis supurativa	160mg en semana 0 80mg en semana 2 40mg en semana 4	40 mg cada semana

Forma de administración


Se recomienda sacar de la nevera al menos 15 min antes de administrarse. Lávese las manos antes de manipular adalimumab. La pluma se presenta lista para administrar, contiene una solución incolora y transparente.

Limpie la zona de inyección con una toallita impregnada de alcohol. Espere a que se evapore el alcohol antes de la inyección. Las zonas de inyección son el abdomen y los muslos. Nunca pinche en una zona enrojecida, dañada o endurecida.



Retire el tapón y coloque la pluma, por la parte verde, sobre la piel formando un ángulo de 90°. Presione la pluma con firmeza hacia su piel para que se inicie la inyección, oirá entonces un "clic".

Mantenga la pluma contra la piel hasta que el indicador amarillo llene la ventana del medicamento y deje de moverse. En ese momento escuchará un segundo "clic". Esto indica el final de la administración. Espere un par de segundos y retire la pluma de la piel.



* Cada pluma es de un solo uso.

Puede ver el video demostrativo que hemos grabado para usted.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

En caso de que olvide una dosis, debe inyectarse la siguiente dosis de adalimumab tan pronto como lo recuerde. La dosis siguiente se administrará el mismo día que estaba previsto inicialmente (como si no hubiera olvidado una dosis).

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento se encuentran: riesgo aumentado de infecciones (que se pueden manifestar con fiebre, heridas, malestar general, problemas dentales, escozor al orinar, tos), efectos adversos en el punto de inyección (inflamación, dolor, enrojecimiento, picor), reacción alérgica (erupción cutánea, ronchas, dificultad para respirar, inflamación cara, manos o pies), debilidad en brazos o piernas, visión doble, hormigueo, dolor en pecho, hinchazón de tobillos y pies, dolor de cabeza, náuseas y diarrea.

Avise a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

Adalimumab se puede tomar junto con metotrexato o con ciertos medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (sulfasalazina, hidroxiclороquina, leflunomida y preparaciones inyectables a base de sales de oro), esteroides o medicamentos para el dolor, incluidos los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs).

Sin embargo, ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de adalimumab. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico y farmacéutico.

Advertencias

- En caso de tener síntomas de cualquier infección informe a su médico.
- Si le van a realizar una intervención quirúrgica o dental, informe a su médico de que está tomando adalimumab
- Algunas vacunas están contraindicadas durante el tratamiento, consulte con su médico antes de ser vacunado.

Embarazo:



No debe tomar adalimumab durante el embarazo a menos que se lo haya indicado específicamente su médico. Si pudiera quedarse embarazada durante el tratamiento, debe utilizar un método eficaz de anticoncepción, incluso hasta 5 meses tras finalizar el tratamiento con adalimumab.

Lactancia:

Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento con adalimumab.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**