

# Tremfya® (guselkumab)



## ¿Qué es y para qué se utiliza?

Tremfya® está indicado para el tratamiento de la psoriasis en placas de moderada a grave en adultos candidatos a tratamiento sistémico (tratamiento con medicamentos que se administran por vía oral o por inyección).

## Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Presentación comercial disponible:  
Tremfya 100 mg solución inyectable

## ¿Cómo se debe conservar?

Guselkumab debe conservarse en nevera (2°C – 8°C). No congelar. Debe conservar la jeringa precargada en el embalaje original para protegerla de la luz


## ¿Cómo se administra?

Debe inyectar el contenido de la jeringa de guselkumab de forma subcutánea. Para evitar lesiones en la piel, debe alternar los lugares de inyección (abdomen, muslo y parte superior del brazo) con cada inyección y evitar la administración en zonas de piel sensible, dañada o con hematomas o cicatrices.

La dosis recomendada de Tremfya es de 100 mg en inyección subcutánea en las semanas 0 y 4, seguida de una dosis de mantenimiento cada 8 semanas.

### Instrucciones de administración

- Saque la jeringa de la nevera: Aunque se debe conservar en la nevera, se recomienda dejar la jeringa a temperatura ambiente durante 30 minutos antes de la administración para que se atempera. Compruebe la fecha de caducidad (CAD) en la parte posterior del envase.
- Elija entre las zonas siguientes para ponerse la inyección:
- Lávese bien las manos con agua tibia y jabón. Inspeccione el líquido, el líquido debe ser transparente o de color amarillo claro y puede contener partículas diminutas translúcidas o blancas. También pueden verse una o más burbujas de aire.
- **Inyecte Tremfya: Coja la jeringa y utilice la otra mano para pellizcar la piel en el lugar de inyección.** Coloque la jeringa en un ángulo de 45° con respecto a la piel. Es importante que pellizque una cantidad de piel suficiente para **inyectar bajo la piel** y no en el músculo. Introduzca la aguja con un movimiento rápido como si lanzase un dardo. **Suelte el pellizco y use esta mano libre para agarrar el cuerpo de la jeringa. Apriete el émbolo.** Coloque el pulgar de la mano contraria sobre el émbolo y apriételo **hasta que se detenga**.
- **Libere la presión del émbolo.** El protector de seguridad cubrirá la aguja y la dejará en su lugar, retirándola de la piel.



- Tire la aguja precargada utilizada

## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida inyectarse una dosis de guselkumab deberá ponerse en contacto con el médico y farmacéutico para conocer cuándo debe inyectarse la siguiente dosis. No se administre una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento se encuentran: infecciones en vías respiratorias altas, así como dolor de cabeza, dolor en las articulaciones y diarrea.

Consulte a su médico y farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

## Uso de otros medicamentos

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de guselkumab. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico y farmacéutico.

## **Advertencias**

### **Embarazo:**



No debe tomar guselkumab durante el embarazo a menos que se lo haya indicado específicamente su médico. Si pudiera quedarse embarazada durante el tratamiento con guselkumab, debe utilizar un método eficaz de anticoncepción durante la duración del tratamiento y al menos 12 semanas después de finalizarlo.

### **Lactancia:**

Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento con guselkumab.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,  
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,  
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**