

Tremfya[®] (guselkumab)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Tremfya[®] está indicado para el tratamiento de la psoriasis en placas de moderada a grave en adultos candidatos a tratamiento sistémico (tratamiento con medicamentos que se administran por vía oral o por inyección).

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Tremfya 100 mg solución inyectable en pluma precargada



¿Cómo se debe conservar?

Se conserva en nevera (2°C – 8°C). No congelar. Debe conservar la jeringa precargada en el embalaje original para protegerla de la luz

¿Cómo se administra?

La dosis es de 100 mg (el contenido de 1 pluma precargada) administrada mediante una inyección bajo la piel (inyección subcutánea). Después de la primera dosis, recibirá la siguiente dosis 4 semanas después y luego la inyección será cada 8 semanas.

1. **Prepare su inyección.** Saque de la nevera el envase de cartón con la pluma precargada. Manténgala en el envase de cartón y póngala en una superficie plana a temperatura ambiente durante al menos 30 minutos antes de utilizarla.
2. **Elija el lugar de inyección:**
 - Parte delantera de los muslos (recomendado)
 - Parte inferior del abdomen. No use el área de 5 cm alrededor del ombligo.
 - Parte posterior de la parte superior del brazo.No inyecte en piel dolorida, con hematomas, roja, descamada, dura o en zonas con cicatrices o estrías
3. Lávese bien las manos con agua tibia y jabón. Limpie la zona de inyección elegida con un algodón con alcohol y deje que se seque.
4. Antes de administrarse Tremfya compruebe el líquido en la ventana de visión. El líquido debe ser transparente o de color amarillo claro y puede contener partículas diminutas translúcidas o blancas. También pueden verse una o más burbujas de aire.
5. **Inyecte Tremfya:** Gire y retire el capuchón inferior. Coloque la pluma precargada directamente sobre la piel (a unos 90 grados respecto al lugar de la inyección). Apriete el pulsador hacia abajo: se inyecta el medicamento al apretar. No levante la pluma precargada durante la inyección.



6. **Inyección finalizada.** Se finaliza la inyección cuando se aprieta el pulsador hacia abajo en todo su recorrido, se oye un clic y ya no se puede ver el cuerpo verde. Levante la pluma, la línea amarilla indica que se ha bloqueado el protector de la aguja.
7. Tire la pluma precargada utilizada. Ponga la pluma precargada utilizada en un recipiente para objetos cortopunzantes después de usarla.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida inyectarse una dosis de guselkumab deberá ponerse en contacto con el médico y farmacéutico para conocer cuándo debe inyectarse la siguiente dosis. No se administre una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento se encuentran: infecciones en vías respiratorias altas, así como dolor de cabeza, dolor en las articulaciones y diarrea.

Consulte a su médico y farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de guselkumab. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico y farmacéutico.

Advertencias

Embarazo:



No debe tomar guselkumab durante el embarazo a menos que se lo haya indicado específicamente su médico. Si pudiera quedarse embarazada durante el tratamiento con guselkumab, debe utilizar un método eficaz de anticoncepción durante la duración del tratamiento y al menos 12 semanas después de finalizarlo.

Lactancia:

Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento con guselkumab.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**