

 GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PUBLICA  DEPARTAMENT DE SALUT VALÈNCIA ARNAU DE VILANOVA-LLÍRIA	INFORMACIÓN AL PACIENTE Unidad Atención Farmacéutica Pacientes Externos (UFPE) Servicio Farmacia. Hospital Arnau de Vilanova Tel: 96 197 60 78 Mail: ufpe_arnau@gva.es	 tu farmacéutico de guardia
---	---	--

Adcirca® (Tadalafil)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Adcirca® contiene tadalafil, un principio activo que ocasiona dilatación de los vasos sanguíneos que se encuentran alrededor de sus pulmones, mejorando el flujo de sangre.



Se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar (HAP), una enfermedad donde se produce un estrechamiento grave de los vasos sanguíneos de los pulmones, aumentando la presión arterial de las arterias pulmonares. El resultado es una disminución de la cantidad de oxígeno que llega a la sangre en los pulmones, haciendo que la actividad física sea más difícil.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Adcirca® 20 mg son comprimidos recubiertos con película de color naranja. Tienen forma de almendra y están marcados con "4467" en una cara.

¿Cómo se debe conservar?

Adcirca® **no requiere condiciones especiales de conservación.**

Mantenga este medicamento fuera de la vista y el alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.

¿Cómo se administra?

La dosis habitual de Adcirca® es de 2 comprimidos de 20 mg tomados una vez al día. Debe tomar los 2 comprimidos al mismo tiempo. Si padece alguna alteración del hígado o del riñón su médico puede aconsejar tomar solo 1 comprimido.

Trague los comprimidos enteros con un vaso de agua. Los comprimidos pueden tomarse con o sin alimentos.

Si toma más comprimidos de los que debiera, consulte con su médico.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvidó tomar Adcirca®, tome su dosis tan pronto como lo recuerde si está dentro de las 8 horas posteriores a la hora en la que debería haberse tomado su dosis. No tome una dosis doble para compensar la que ha olvidado.




No interrumpa el tratamiento con Tadalafil a menos que su médico se lo indique. Es posible que su médico le indique que reduzca la dosis durante algunos días antes de dejar de tomarlo por completo.

¿Qué efectos adversos más frecuentes pueden aparecer durante el tratamiento?

Este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Estos efectos adversos son generalmente de intensidad leve a moderada. Las **reacciones adversas más frecuentes** son: dolor de cabeza, enrojecimiento, congestión nasal, náuseas, indigestión, dolores musculares, dolor de espalda y dolor en las extremidades.

También podrían darse otros efectos adversos menos frecuentes pero más graves. **Acuda a su médico si experimenta cualquiera de los siguientes efectos adversos:** reacción alérgica, dolor en el pecho, erección prolongada y dolorosa o pérdida de visión repentina.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, informe a su médico o farmacéutico.

 <p>GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA</p>  <p>DEPARTAMENT DE SALUT VALÈNCIA ARNAU DE VILANOVA-LLÍRIA</p>	<p>INFORMACIÓN AL PACIENTE</p> <p>Unidad Atención Farmacéutica Pacientes Externos (UFPE) Servicio Farmacia. Hospital Arnau de Vilanova Tel: 96 197 60 78 Mail: ufpe_arnau@gva.es</p>	 <p>tu farmacéutico de guardia</p>
--	--	--

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. Especialmente si usted está en tratamiento con alguno de estos fármacos:

- bosentan o riociguat (para tratar la hipertensión arterial pulmonar)
- nitratos (para el dolor de pecho)
- medicamentos para tratar la hipertensión arterial o problemas de próstata
- rifampicina o ketoconazol (para tratar infecciones)
- ritonavir (para la infección por VIH)

Advertencias

Conducción y uso de máquinas

El uso de Adcirca® puede ocasionar mareos. Compruebe cómo reacciona al medicamento antes de conducir o utilizar máquinas.



Embarazo

No tome Adcirca® si está embarazada o planea quedarse embarazada, a menos que sea estrictamente necesario y lo haya acordado con su médico.



Lactancia

Informe a su médico si está en periodo de lactancia. Se le aconseja interrumpir el periodo de lactancia si se le prescribe Adcirca®, ya que no se conoce si este medicamento pasa a la leche materna.

Excipientes de declaración obligatoria

Lauril sulfato sódico, croscarmelosa sódica y lactosa hidratada.

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS, POR FAVOR,
DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA**