

## Adempas® (Riociguat)

### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Adempas® contiene riociguat, un principio activo que actúa ensanchando las arterias pulmonares, facilitando al corazón el bombeo de sangre a los pulmones.

Se utiliza para el tratamiento de ciertas formas de hipertensión arterial pulmonar (HAP), una enfermedad donde se produce un estrechamiento grave de los vasos sanguíneos de los pulmones, aumentando la presión arterial de las arterias pulmonares. El resultado es una disminución de la cantidad de oxígeno que llega a la sangre en los pulmones, haciendo que la actividad física sea más difícil.



### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Adempas® 2,5 mg son comprimidos recubiertos con película de color anaranjado. Tienen forma redondeada y están marcados con la cruz de Bayer en un lado y "2,5 R" en el otro.

### ¿Cómo se debe conservar?

Adempas® **no requiere condiciones especiales de conservación.**

Mantenga este medicamento fuera de la vista y el alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.

### ¿Cómo se administra?

La dosis inicial recomendada es de 1 comprimido de 1 mg, tres veces al día durante 2 semanas. Su médico le irá aumentando progresivamente la dosis hasta un máximo de 2,5 mg tres veces al día.

Lo más recomendable es tomar el comprimido entero, con un vaso de agua. Si tiene dificultad para tragar el comprimido, puede triturarse y mezclarse con agua o con un alimento blando.

Si toma más Adempas® de lo que debe informe a su médico lo antes posible.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvidó tomar Adempas® continúe con la siguiente dosis, según lo previsto. No tome una dosis doble para compensar la que ha olvidado.

**No interrumpa el tratamiento** con riociguat a menos que su médico se lo indique. Es posible que su médico le indique que reduzca la dosis durante algunos días antes de dejar de tomarlo por completo.



### ¿Qué efectos adversos más frecuentes pueden aparecer durante el tratamiento?

Este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Estos efectos adversos son generalmente de intensidad leve a moderada.

Las **reacciones adversas más frecuentes** son: dolor de cabeza, enrojecimiento, congestión nasal, náuseas, indigestión, dolores musculares, dolor de espalda y dolor en las extremidades.

También podrían darse otros efectos adversos menos frecuentes pero más graves. **Acuda a su médico si experimenta cualquiera de los siguientes efectos adversos:** reacción alérgica, dolor en el pecho, erección prolongada y dolorosa o pérdida de visión repentina.

**Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, informe a su médico o farmacéutico.**

 <p>GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA</p> <p>DEPARTAMENT DE SALUT VALÈNCIA ARNAU DE VILANOVA-LLIRIA</p>	<p><b>INFORMACIÓN AL PACIENTE</b></p> <p><b>Unidad Atención Farmacéutica Pacientes Externos (UFPE)</b>  <b>Servicio Farmacia. Hospital Arnau de Vilanova</b>  Tel: 96 197 60 78  Mail: ufpe_arnau@gva.es</p>	 <p><b>tu farmacéutico de guardia</b></p>
--	--	--

### Uso de otros medicamentos

**Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. Especialmente si usted está en tratamiento con alguno de estos fármacos:**

- Bosentán o sildenafilo, tadanafilo, vadenafilo (para tratar la hipertensión arterial pulmonar)
- Nitratos (para el dolor de pecho)
- Antifúngicos (ketonocazol, posaconazol, itraconazol)
- Ciclosporina (inmunosupresor)
- Medicamentos para la infección por VIH
- Antiácidos (hidróxido de aluminio/magnesio)
- Fenitoína, carbamazepina, fenobarbital (antiepilépticos)

### Advertencias

#### Conducción y uso de máquinas

Adempas® influye de forma moderada en la capacidad para conducir y utilizar máquinas.



#### Embarazo

No tome Adempas® durante el embarazo. Si existe posibilidad de quedarse embarazada, utilice métodos anticonceptivos efectivos mientras tome este tratamiento.



#### Lactancia

No debe dar el pecho mientras esté tomando este medicamento. Su médico y usted deberán decidir si debe interrumpir la lactancia o bien interrumpir el tratamiento con Adempas®.

#### Excipientes de declaración obligatoria

Lauril sulfato sódico, propilenglicol y lactosa hidratada.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO**  
**Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS, POR FAVOR,  
DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA**