

Bosentán Accordpharma®

¿Qué es y para qué se utiliza?

Bosentán es un principio activo que ocasiona dilatación de los vasos sanguíneos por bloqueo de una hormona que ocasiona su estrechamiento, la endotelina-1.

Se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar (HAP), una enfermedad donde se produce un estrechamiento grave de los vasos sanguíneos de los pulmones, aumentando la presión arterial de las arterias pulmonares. El resultado es una disminución de la cantidad de oxígeno que puede llegar a la sangre en los pulmones, haciendo que la actividad física sea más difícil.



Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Bosentán Accordpharma 62,5 mg son comprimidos de color anaranjado, biconvexos, recubiertos con película, con la marca "IB1" en una cara y lisos en la otra cara.

Bosentán Accordpharma 125 mg son comprimidos de color anaranjado, biconvexos, recubiertos con película con la marca "M" en una cara y "BN2" en la otra.

¿Cómo se debe conservar?

Bosentán **no requiere condiciones especiales de conservación.**

Mantenga este medicamento fuera de la vista y el alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.

¿Cómo se administra?

El tratamiento en adultos se inicia habitualmente con 62,5 mg dos veces al día (mañana y noche) durante las primeras 4 semanas. Después su médico le aumentará la dosis a 125 mg dos veces al día, dependiendo de cómo responda al tratamiento.

Los comprimidos deben tragarse con un vaso de agua. Se pueden tomar con o sin alimentos.

Si toma más comprimidos de los que debe, consulte inmediatamente con su médico.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvidó tomar bosentán, tome la dosis en cuanto se acuerde y después continúe tomándolo en su horario habitual. No tome una dosis doble para compensar dosis olvidadas.

No interrumpa el tratamiento con bosentán a menos que su médico se lo indique. Es posible que su médico le indique que reduzca la dosis durante algunos días antes de dejar de tomarlo por completo.




¿Qué efectos adversos más frecuentes pueden aparecer durante el tratamiento?

Este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Las **reacciones adversas más frecuentes** son: anemia y alteración de la función hepática que ocasiona síntomas como náuseas, vómitos, fiebre, dolor de estómago, ictericia, orina de color oscuro, picor de la piel, fatiga y dolor muscular/articular

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, informe a su médico o farmacéutico.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

 <p>GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PUBLICA</p>  <p>DEPARTAMENT DE SALUT VALÈNCIA ARNAU DE VILANOVA-LLÍRIA</p>	<p>INFORMACIÓN AL PACIENTE</p> <p>Unidad Atención Farmacéutica Pacientes Externos (UFPE) Servicio Farmacia. Hospital Arnau de Vilanova Tel: 96 197 60 78 Mail: ufpe_arnau@gva.es</p>	 <p>tu farmacéutico de guardia</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los siguientes medicamentos **no se deben administrar junto con bosentán:**

- Ciclosporina A, sirolimus o tacrólimus (inmunosupresores)
- Rifampicina (medicamento para la tuberculosis)
- Fluconazol y ketoconazol (medicamento para tratar infecciones por hongos)
- Glibenclamida (antidiabético oral)
- Nevirapina (medicamento para el VIH)

Otros medicamentos que pueden requerir un **control especial** si se toman con bosentán son:

- Resto de medicamentos para tratar el VIH.
- Anticonceptivos orales (no serán efectivos como único método anticonceptivo)
- Sildenafil o tadalafilo (para tratar la hipertensión pulmonar)
- Warfarina (agente anticoagulante).
- Simvastatina (para tratar la hipercolesterolemia)

Advertencias

Conducción y uso de máquinas

El uso de bosentán puede inducir hipotensión, ocasionando mareos y afectación de la visión. Esto hará que disminuya su capacidad de conducción y uso de máquinas. Por tanto, si se siente mareado o ve borroso mientras está en tratamiento con este medicamento, no conduzca o maneje herramientas o maquinaria.



Embarazo

No tome bosentán si está embarazada o planea quedarse embarazada.

Si es una mujer en edad fértil su médico le pedirá que se realice una prueba de embarazo antes de empezar el tratamiento con bosentán y de forma regular durante el tratamiento.

Si es posible que pueda quedarse embarazada, utilice un método anticonceptivo fiable mientras esté en tratamiento con este medicamento. Si utiliza un anticonceptivo hormonal, debe también emplear un método de barrera.



Lactancia

Informe a su médico si está en periodo de lactancia. Se le aconseja interrumpir el periodo de lactancia si se le prescribe bosentán, ya que no se conoce si este medicamento pasa a la leche materna.

Excipientes de declaración obligatoria

Almidón de maíz, carboximetilalmidón sódico, laurilsulfato sódico y debehenoato de glicerol.

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS, POR FAVOR,
DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA**