

 <p>GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PUBLICA</p>  <p>DEPARTAMENT DE SALUT VALÈNCIA ARNAU DE VILANOVA-LLÍRIA</p>	<p><b>INFORMACIÓN AL PACIENTE</b></p> <p><b>Unidad Atención Farmacéutica Pacientes Externos (UFPE)</b>  <b>Servicio Farmacia. Hospital Arnau de Vilanova</b>  Tel: 96 197 60 78  Mail: ufpe_arnau@gva.es</p>	 <p><b>tu farmacéutico de guardia</b></p>
--	--	--

## Opsumit® (Macitentan)

### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Opsumit® contiene Macitentan, un principio activo que ocasiona dilatación de los vasos sanguíneos por bloqueo de una hormona que ocasiona su estrechamiento, la endotelina-1.

Se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar (HAP), una enfermedad donde se produce un estrechamiento grave de los vasos sanguíneos de los pulmones, aumentando la presión arterial de las arterias pulmonares. El resultado es una disminución de la cantidad de oxígeno que puede llegar a la sangre en los pulmones, haciendo que la actividad física sea más difícil.



### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Opsumit® 10 mg comprimidos recubiertos con película, de color blanquecino, redondos y con "10" grabado en ambos lados.

Opsumit® **no requiere condiciones especiales de conservación.**

Mantenga este medicamento fuera de la vista y el alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.

### ¿Cómo se administra?

El tratamiento en adultos se inicia con 62,5 mg dos veces al día (mañana y noche) durante las primeras 4 semanas. Después su médico normalmente le aumentará la dosis a 125 mg dos veces al día, dependiendo de cómo responda al tratamiento.

Los comprimidos deben tragarse con un vaso de agua. Se pueden tomar con o sin alimentos.

Si toma más comprimidos de los que debe, consulte inmediatamente con su médico.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvidó tomar Macitentan, tome a dosis en cuanto se acuerde y después continúe tomándolo en su horario habitual. No tome una dosis doble para compensar dosis olvidadas.

**No interrumpa el tratamiento** con Macitentan a menos que su médico se lo indique. Es posible que su médico le indique que reduzca la dosis durante algunos días antes de dejar de tomarlo por completo.

### ¿Qué efectos adversos más frecuentes pueden aparecer durante el tratamiento?

Este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Las **reacciones adversas más frecuentes** son: anemia y alteración de la función hepática que ocasiona síntomas como náuseas, vómitos, fiebre, dolor de estómago, ictericia, orina de color oscuro, picor de la piel, fatiga y dolor muscular/articular

**Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, informe a su médico o farmacéutico.**

### Uso de otros medicamentos

**Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.**

Los siguientes medicamentos **no se deben administrar junto con Macitentan:**

- Rifampicina (medicamento para la tuberculosis)
- Carbamazepina y fenitoína (antiepilépticos)

 <p>GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA</p>  <p>DEPARTAMENT DE SALUT VALÈNCIA ARNAU DE VILANOVA-LLÍRIA</p>	<p><b>INFORMACIÓN AL PACIENTE</b></p> <p><b>Unidad Atención Farmacéutica Pacientes Externos (UFPE)</b>  <b>Servicio Farmacia. Hospital Arnau de Vilanova</b>  Tel: 96 197 60 78  Mail: ufpe_arnau@gva.es</p>	 <p><b>tu farmacéutico de guardia</b></p>
--	--	--

- Hierba de San Juan

Otros medicamentos que pueden requerir un control especial si se toman con Macitentán son:

- Itraconazol, ketoconazol, voriconazol (medicamentos para tratar infecciones por hongos)
- Claritromicina (antibiótico)
- Ritonavir y saquinavir (medicamentos para VIH).

### Advertencias

#### Conducción y uso de máquinas

El uso de Macitentán puede inducir hipotensión, ocasionando mareos y afectación de la visión. Esto hará que disminuya su capacidad de conducción y uso de máquinas. Por tanto, si se siente mareado o ve borroso mientras está en tratamiento con este medicamento, no conduzca o maneje herramientas o maquinaria.



#### Embarazo

No tome Macitentán si está embarazada o planea quedarse embarazada.

Si es una mujer en edad fértil su médico le pedirá que se realice una prueba de embarazo antes de empezar el tratamiento con Macitentán y de forma regular durante el tratamiento.

Si es posible que pueda quedarse embarazada, utilice un método anticonceptivo fiable mientras esté en tratamiento con este medicamento. Si utiliza un anticonceptivo hormonal, debe también emplear un método de barrera



#### Lactancia

Informe a su médico si está en periodo de lactancia. Se le aconseja interrumpir el periodo de lactancia si se le prescribe Macitentán, ya que no se conoce si este medicamento pasa a la leche materna.

#### Excipientes de declaración obligatoria

Almidón de maíz, carboximetilalmidón sódico, laurilsulfato sódico y debehenoato de glicerol.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO**  
**Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS, POR FAVOR,  
DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA**