

 <p>GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA</p>  <p>DEPARTAMENT DE SALUT VALÈNCIA ARNAU DE VILANOVA-LLÍRIA</p>	<p><b>INFORMACIÓN AL PACIENTE</b></p> <p><b>Unidad Atención Farmacéutica Pacientes Externos (UFPE)</b>  <b>Servicio Farmacia. Hospital Arnau de Vilanova</b>  Tel: 96 197 60 78  Mail: ufpe_arnau@gva.es</p>	 <p><b>tu farmacéutico de guardia</b></p>
--	--	--

## Entecavir Dr. Reddys®

### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Entecavir está indicado para el tratamiento de la infección crónica por el virus de la hepatitis B (VHB) en adultos y niños de 2 a 18 años.



### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Entecavir Dr. Reddys® son comprimidos ovalados blancos ranurados recubiertos con película.

### ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30°C).

### ¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico.

La dosis recomendada es de entre 0,5 a 1 mg cada 24 horas. Se puede tomar con o sin alimentos.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- Es importante que no olvide tomar ninguna dosis.
- Si usted olvida una dosis de entecavir, debe tomarla enseguida y después tomar la siguiente dosis prevista a la hora habitual. Si ya es casi la hora de su siguiente dosis, no tome la dosis que olvidó. Espere y tome la dosis siguiente a la hora habitual.
- No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes (que pueden aparecer o no) son: dolor de cabeza, insomnio (incapacidad para dormir), fatiga (cansancio extremo), mareos, somnolencia (adormecimiento), vómitos, diarrea, náuseas, dispepsia (indigestión) e incremento de los niveles de enzimas hepáticas en sangre.




Otros efectos adversos menos frecuentes son: erupción cutánea o pérdida de cabello.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

### Uso de otros medicamentos

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Entecavir cuando se administran conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. De igual modo, Entecavir puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

 <p>GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA</p>  <p>DEPARTAMENT DE SALUT VALÈNCIA ARNAU DE VILANOVA-LLÍRIA</p>	<p><b><u>INFORMACIÓN AL PACIENTE</u></b></p> <p><b>Unidad Atención Farmacéutica Pacientes Externos (UFPE)</b>  <b>Servicio Farmacia. Hospital Arnau de Vilanova</b>          Tel: 96 197 60 78          Mail: ufpe_arnau@gva.es</p>	 <p><b>tu farmacéutico de guardia</b></p>
--	---	--

### **Advertencias**

#### **Conducción y uso de máquinas**

No se han realizado estudios de los efectos de Entecavir sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Dado que los mareos, la fatiga y la somnolencia son reacciones adversas frecuentes que podrían alterar la capacidad para conducir y utilizar máquinas, hay que tener precaución.



#### **Embarazo:**

Está contraindicada la administración de Entecavir en pacientes embarazadas. En pacientes en edad fértil se debe asegurar el cumplimiento de las condiciones del Programa de Prevención del Embarazo.

#### **Lactancia:**

No debe dar el pecho durante el tratamiento con Entecavir, dado que se desconoce si pasa a la leche materna. Si lo está haciendo, comuníquese a su médico.

#### **Excipientes de declaración obligatoria**

Lactosa monohidrato y almidón de maíz.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO**  
**Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS, POR FAVOR,  
DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA**