

 <p>GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PUBLICA</p>  <p>DEPARTAMENT DE SALUT VALÈNCIA ARNAU DE VILANOVA-LLÍRIA</p>	<p><b>INFORMACIÓN AL PACIENTE</b></p> <p><b>Unidad Atención Farmacéutica Pacientes Externos (UFPE)</b>  <b>Servicio Farmacia. Hospital Arnau de Vilanova</b>  Tel: 96 197 60 78  Mail: ufpe_arnau@gva.es</p>	 <p><b>tu farmacéutico de guardia</b></p>
--	--	--

## Imbruvica® (Ibrutinib)

### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Imbruvica® está **indicado en el tratamiento de distintas enfermedades hematológicas**: linfoma de células del manto en recaída o refractario, leucemia linfática crónica y macroglobulinemia de Waldenström. Ibrutinib disminuye el crecimiento del tumor.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

**Imbruvica® 420 mg** comprimidos recubiertos con película, de forma ovalada, de color amarillo-verdoso, marcado con “ibr” en una cara y “420” en la otra.

**Imbruvica® 560 mg** comprimidos recubiertos con película, de forma ovalada, de color amarillo-naranja, marcado con “ibr” en una cara y “560” en la otra.



### ¿Cómo se debe conservar?

**Conservar a temperatura ambiente** (nunca superior a 30°C).

### ¿Cómo se administra?

Dependiendo de su patología su médico le pautará la dosis de 420 mg o de 560 mg. En cualquier caso debe tomar **un comprimido al día**, con un vaso de agua y aproximadamente todos los días a la misma hora.

Los comprimidos se pueden tomar con o sin alimentos. No se debe tomar con zumo de pomelo o naranjas amargas.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvidó tomar Imbruvica®, tome a dosis en cuanto se acuerde y después continúe tomándolo en su horario habitual. No tome una dosis doble para compensar dosis olvidadas.

**No interrumpa el tratamiento** con Imbruvica® a menos que su médico se lo indique. Es posible que su médico le indique que reduzca la dosis durante algunos días antes de dejar de tomarlo por completo.

### ¿Qué efectos adversos más frecuentes pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los **efectos adversos más frecuentes** asociados al tratamiento con Imbruvica® se encuentran: infecciones, anemia, mareo, cefalea, sangrado, diarrea, vómitos, náuseas, estreñimiento, enrojecimiento de la piel, dolor muscular y óseo.




**Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.**

### Uso de otros medicamentos

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Imbruvica® cuando se administran conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo.

Los siguientes medicamentos están contraindicados con el uso de Imbruvica®: claritromicina, cobicistat, ketoconazol, voriconazol, eritromicina, hierba de San Juan; entre otros.

**No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.**

 <p>GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PUBLICA</p>  <p>DEPARTAMENT DE SALUT VALÈNCIA ARNAU DE VILANOVA-LLÍRIA</p>	<p><b>INFORMACIÓN AL PACIENTE</b></p> <p><b>Unidad Atención Farmacéutica Pacientes Externos (UFPE)</b>  <b>Servicio Farmacia. Hospital Arnau de Vilanova</b>  Tel: 96 197 60 78  Mail: ufpe_arnau@gva.es</p>	 <p><b>tu farmacéutico de guardia</b></p>
--	--	--

### Advertencias

#### Conducción y uso de máquinas

Es posible que sienta cansancio o mareo después de tomar Imbruvica®, lo que puede afectar a su capacidad para conducir o usar máquinas.



#### Embarazo

Está contraindicada la administración de Imbruvica® en pacientes embarazadas.

Las mujeres en edad fértil deben asegurarse de utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y hasta 3 meses tras finalizar el tratamiento.



#### Lactancia

Debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con Imbruvica®.

#### Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa monohidrato, croscarmelosa sódica y laurilsulfato de sodio.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO**  
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS, POR FAVOR,  
DEVUÉLVVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA**