 <p>GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PUBLICA</p>  <p>DEPARTAMENT DE SALUT VALÈNCIA ARNAU DE VILANOVA-LLÍRIA</p>	<p>INFORMACIÓN AL PACIENTE</p> <p>Unidad Atención Farmacéutica Pacientes Externos (UFPE) Servicio Farmacia. Hospital Arnau de Vilanova Tel: 96 197 60 78 Mail: ufpe_arnau@gva.es</p>	 <p>tu farmacéutico de guardia</p>
--	--	--

Maviret® (Glecaprevir/pibrentasvir)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Maviret® es un medicamento que contiene 2 principios activos en un sólo comprimido: elbasvir y grazoprevir. Se utiliza para el **tratamiento de la infección crónica** causada por el virus de la **hepatitis C** en adultos de 18 años de edad o mayores. Esta enfermedad afecta principalmente al hígado.

Los principios activos de este medicamento bloquean 2 proteínas diferentes del virus que necesita para crecer y reproducirse, lo que hace que se elimine el virus permanentemente del organismo.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Maviret® 100/40 mg comprimidos recubiertos con película. Los comprimidos son de color rosa, ovalados, con forma curva en ambas caras y marcados con "NXT" en una cara.

¿Cómo se debe conservar?

Maviret® no requiere condiciones especiales de conservación.

Mantenga este medicamento fuera de la vista y el alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.

¿Cómo se administra?

La dosis recomendada es de 3 comprimidos tomados a la vez, una vez al día. La dosis diaria son los 3 comprimidos de un blíster.

Trague el comprimido entero con alimentos. No mastique, machaque ni parta el comprimido.

Si vomita en menos de 3 horas después de tomar Maviret®, tome otro comprimido. Si vomita tras más de 3 horas después de toma Maviret®, no es necesario que tome otro comprimido hasta el próximo que tiene programado.

Si toma accidentalmente más cantidad del que debe, debe ponerse en contacto con su médico o servicio de urgencias más cercano para que le asesoren.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si omite una dosis, **calcule cuánto tiempo hace que tomó el último comprimido** de Maviret®:

- Si han pasado menos de 18 horas, debe tomar el comprimido lo antes posible. A continuación, tome la siguiente dosis a la hora habitual.
- Si han pasado 18 horas o más, no tome la dosis olvidada. Espere y tome la siguiente dosis a la hora habitual.

No interrumpa el tratamiento con Maviret® a menos que su médico se lo indique. Es muy importante que finalice el ciclo completo de tratamiento.




¿Qué efectos adversos más frecuentes pueden aparecer durante el tratamiento?

Este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Las **reacciones adversas más frecuentes son:** sensación de cansancio, dolor de cabeza, náuseas, diarrea y sensación de debilidad o falta de energía.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, informe a su médico o farmacéutico.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos.

 <p>GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PUBLICA</p>  <p>DEPARTAMENT DE SALUT VALÈNCIA ARNAU DE VILANOVA-LLÍRIA</p>	<p>INFORMACIÓN AL PACIENTE</p> <p>Unidad Atención Farmacéutica Pacientes Externos (UFPE) Servicio Farmacia. Hospital Arnau de Vilanova Tel: 96 197 60 78 Mail: ufpe_arnau@gva.es</p>	 <p>tu farmacéutico de guardia</p>
--	--	--

Hay algunos **medicamentos que no debe tomar con Maviret®**. Informe a su médico si está tomando alguno de los siguientes medicamentos:

- Digoxina (para problemas de corazón)
- Dabigatrán y antagonistas de la vitamina K (acenocumarol y warfarina)
- Carbamazepina, fenobarbital, fenitoína o primidona (antiepilépticos)
- Rifampicina (antibiótico)
- medicamentos que contienen etinilestradiol (como los anticonceptivos)
- hierva de San Juan (medicamento a base de plantas para tratar casos de depresión leve)
- darunavir, efavirenz, lopinavir o ritonavir (para la infección por el VIH)
- Sofosbuvir (para tratar la hepatitis C).
- Atorvastatina, simvastatina, lovastatina y otras estatinas para reducir el colesterol en sangre
- Ciclosporina y tacrólimus (para reducir la actividad del sistema inmune)

Advertencias

Conducción y uso de máquinas

Maviret® no debe afectar a su capacidad para conducir usar cualquier herramienta o maquinaria. En cualquier caso, no conduzca o use máquinas si se siente cansado después de tomar el medicamento.



Embarazo

Si está embarazada, cree que podría estarlo o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. Se desconocen los efectos de este medicamento en mujeres embarazadas, por lo que no se recomienda tomar Maviret® durante el embarazo.



Lactancia

Consulte a su médico antes de tomar Maviret® si está en periodo de lactancia. Se desconoce si el medicamento pasa a la leche materna.

Excipientes de declaración obligatoria

Glicerol de monocaprilcaptrato, croscarmelosa sódica y fumarato de estearilo y sodio.

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS, POR FAVOR,
DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA**