

INFORMACIÓN AL PACIENTE

Unidad Atención Farmacéutica Pacientes Externos (UFPE)
Servicio Farmacia. Hospital Arnau de Vilanova
Tel: 96 197 60 78
Mail: ufpe_arnau@gva.es





tu farmacéutico
de guardia

Xolair® (Omalizumab)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Xolair® contiene una sustancia activa que se llama omalizumab. Es una proteína humana que pertenece a la clase de medicamentos denominados anticuerpos monoclonales.

Xolair® se utiliza para el tratamiento del asma alérgica y para la urticaria crónica espontánea cuyos síntomas no se controlan con otros medicamentos indicados para estas patologías.



Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Xolair® 75 mg solución inyectable contiene en el envase 1 jeringa pregarcada con un líquido incoloro o ligeramente amarillo.

Xolair® 150 mg solución inyectable contiene en el envase 1 jeringa pregarcada con un líquido incoloro o ligeramente amarillo.

¿Cómo se debe conservar?

Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar.

Mantener en el envase original para protegerlo de la luz.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.

¿Cómo se administra?

Su médico le prescribirá la dosis necesaria en función de su peso corporal y de los resultados del análisis de la concentración de inmunoglobulina E realizados antes del inicio del tratamiento.

Se pueden administrar entre 1 y 4 inyecciones al mismo tiempo, cada 2 o 4 semanas.

Xolair® se administra en forma de una inyección debajo de la piel, es decir una inyección subcutánea.

Instrucciones de administración

- Para evitar cualquier molestia en el lugar de inyección, mantenga la(s) jeringa(s) a temperatura ambiente durante al menos 30 minutos antes de la inyección.
- Saque la bandeja de plástico de la caja y retire el papel que la cubre. Agarre la jeringa por la mitad de su protector azul/morado y extraiga la jeringa de la bandeja. Inspeccione la jeringa, el líquido debe ser transparente o ligeramente turbio. Compruebe la fecha de caducidad de la jeringa.
- Limpie la zona de inyección con una toallita humedecida con alcohol y deje secar la piel. Elija un lugar diferente cada vez que se ponga una inyección.
- Retire con cuidado el capuchón de la aguja de la jeringa. Pellizque suavemente la piel del lugar de la inyección e introduzca la aguja por completo, inclinado la jeringa en un ángulo de 45°.
- Presione lentamente el émbolo hasta el final, de manera que la cabeza del émbolo quede encajada en el los clips de activación del protector. Mantenga completamente presionado el émbolo mientras retire la aguja. Suelte el émbolo y deje que el protector de la jeringa tape automáticamente la aguja.
- Deseche la jeringa usada en un contenedor para eliminar objetos punzantes.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvidó una dosis de Xolair® contacte con s médico tan pronto como sea posible para volver a programar una visita.

No interrumpa el tratamiento con Xolair® a menos que su médico se lo indique.

INFORMACIÓN AL PACIENTE

Unidad Atención Farmacéutica Pacientes Externos (UFPE)
Servicio Farmacia. Hospital Arnau de Vilanova
Tel: 96 197 60 78
Mail: ufpe_arnau@gva.es



¿Qué efectos adversos más frecuentes pueden aparecer durante el tratamiento?

Este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Estos efectos adversos son generalmente de intensidad leve a moderada. Las **reacciones adversas más frecuentes** son: reacciones en la zona de inyección con dolor, hinchazón, picor y enrojecimiento; dolor de cabeza, sensación de mareo y dolor en las articulaciones.

También podrían darse otros efectos adversos menos frecuentes pero más graves. **Acuda a su médico si experimenta cualquiera de los siguientes efectos adversos:** reacción alérgica, o lupus eritematoso sistémico (LES) con síntomas como dolor muscular, hinchazón de articulaciones, erupción, fiebre, pérdida de peso y fatiga.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, informe a su médico o farmacéutico.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. Especialmente si usted está en tratamiento con:

- Medicamentos para tratar una infección causada por parásitos.
- Corticoides inhalados y otros medicamentos para el asma alérgica.

Advertencias

Conducción y uso de máquinas

No es probable que Xolair® afecte a su capacidad para conducir y usar máquinas.

Embarazo

Si está embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. Comentará con usted los beneficios y riesgos para tomar una decisión conjunta.



Lactancia

Xolair® puede pasar a la leche materna. Si usted está dando el pecho, consulte a su médico antes de usar este medicamento.

Excipientes de declaración obligatoria

Este medicamento no contiene excipientes de declaración obligatoria.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS, POR FAVOR,
DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA**