

INFORMACIÓN AL PACIENTE

Unidad Atención Farmacéutica Pacientes Externos (UFPE)
Servicio Farmacia. Hospital Arnau de Vilanova
Tel: 96 197 60 78
Mail: ufpe_arnau@gva.es

Zepatier® (Elbasvir/grazoprevir)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Zepatier® es un medicamento que contiene 2 principios activos en un sólo comprimido: elbasvir y grazoprevir. Se utiliza para el **tratamiento de la infección** crónica causada por el virus de la **hepatitis C** en adultos de 18 años de edad o mayores. Esta enfermedad afecta principalmente al hígado. Los principios activos de este medicamento bloquean 2 proteínas diferentes del virus, lo que imposibilita su crecimiento y replicación, haciendo que se elimine el virus permanentemente del organismo.



Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Zepatier® 50/100 mg comprimidos recubiertos con película. Los comprimidos son de color beige, ovalados y grabados con la inscripción "770" en una cara.

¿Cómo se debe conservar?

Zepatier® no requiere condiciones especiales de conservación.

Mantenga este medicamento fuera de la vista y el alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.

¿Cómo se administra?

La dosis recomendada es un comprimido una vez al día, normalmente durante 12 semanas.

Trague el comprimido entero con o sin alimentos. No mastique, machaque ni parta el comprimido.

Si toma accidentalmente más cantidad del que debe, debe ponerse en contacto con su médico o servicio de urgencias más cercano para que le asesoren.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si omite una dosis, **calcule cuánto tiempo hace que tomó el último comprimido** de Zepatier®:

- Si han pasado menos de 16 horas, debe tomar el comprimido lo antes posible. A continuación, tome la siguiente dosis a la hora habitual.
- Si han pasado 16 horas o más, no tome la dosis olvidada. Espere y toma la siguiente dosis a la hora habitual.

No interrumpa el tratamiento con Zepatier® a menos que su médico se lo indique. Es muy importante que finalice el ciclo completo de tratamiento.

¿Qué efectos adversos más frecuentes pueden aparecer durante el tratamiento?

Este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Las **reacciones adversas más frecuentes son**: sensación de estar muy cansado (fatiga), dolor de cabeza, náuseas, picor, diarrea/estreñimiento, insomnio, dolor de articulaciones, sensación de mareo, pérdida de apetito, dolor muscular, dolor de estómago, depresión o boca seca.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, informe a su médico o farmacéutico.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos.

Hay algunos **medicamentos que no debe tomar con Zepatier®**. Informe a su médico si está tomando alguno de los siguientes medicamentos:

- Dabigatrán y antagonistas de la vitamina K (acenocumarol, warfarina)
- Carbamazepina, fenitoína (antiepilépticos)
- Ketoconazol (antifúngico) y rifampicina (antimicrobiano)
- Bosentán (para tratar la hipertensión pulmonar)
- Hierba de San Juan
- Antivirales para VIH
- Rosuvastatina, atorvastatina u otras estatinas para reducir el colesterol en sangre.
- Ciclosporina y tacrólimus (inmunosupresores)
- Sunitinib para tratar ciertos tipos de cáncer
- Modafinilo para tratar la somnolencia asociada a narcolepsia

Advertencias

Conducción y uso de máquinas

Zepatier® no debe afectar a su capacidad para conducir usar cualquier herramienta o maquinaria. En cualquier caso, no conduzca o use máquinas si se siente cansado después de tomar el medicamento.



Embarazo

Si está embarazada, cree que podría estarlo o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. Se desconocen los efectos de este medicamento en mujeres embarazadas.

Zepatier® se usa a veces con ribavirina. La ribavirina puede dañar al feto, por lo que es muy importante que usted o su pareja no se quede embarazada durante este tratamiento ni durante cierto tiempo después de completar el tratamiento. Debe leer la sección “Embarazo” del prospecto de la ribavirina y preguntar a su médico qué método anticonceptivo eficaz es adecuado para usted y su pareja.



Lactancia

Consulte a su médico antes de tomar Zepatier® si está en periodo de lactancia. Se desconoce si el medicamento pasa a la leche materna.

Excipientes de declaración obligatoria

Lauril sulfato sódico, manitol (E-421), croscarmelosa sódica, cloruro de sodio y lactosa monohidrato.

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS, POR FAVOR,
DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA**