

Dupixent® (Dupilumab)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Dupixent® contiene el principio activo dupilumab, una proteína específica que bloquea la acción de moléculas clave en la aparición de signos y síntomas relacionados con la dermatitis atópica, el asma y la rinosinusitis crónica con poliposis nasal.

Está indicado para el tratamiento de la dermatitis atópica de moderada a grave, en adultos y adolescentes a partir de 12 años. Se usa también para el tratamiento de mantenimiento del asma grave y de la rinosinusitis crónica con poliposis nasal.



Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Dupixent® 300 mg solución inyectable en pluma precargada.

¿Cómo se debe conservar?


Conserve Dupixent® en la nevera, entre 2-8°C (NUNCA en el congelador).

Si es necesario, las plumas precargadas se pueden mantener a temperatura ambiente (25°C) durante un máximo de 14 días. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz.



¿Cómo se administra?


La dosis puede variar dependiendo de su patología y su peso. La pauta habitual es una dosis inicial de 600 mg, seguidos de 300 mg cada 2 semanas. El médico le prescribirá la pauta más adecuada para su caso.



Debe inyectar el contenido de la jeringa de forma subcutánea. Para evitar lesiones en la piel, debe alternar los lugares de inyección (abdomen, muslo) y evitar la administración en zonas de piel sensible, dañada o con hematomas o cicatrices.

Instrucciones de administración:

- Saque la pluma de la nevera y déjela a temperatura ambiente (20 a 25°C) durante 45 minutos antes de administrarla. Observe el líquido a través de la ventana de visión. El líquido debe ser claro e incoloro/amarillento. El lugar recomendado para la inyección es la parte anterior del muslo o la parte baja del abdomen. Si otra persona le administra la inyección, puede hacerlo en la parte superior del brazo. Para cada inyección elija un lugar diferente, separados al menos 3 cm del lugar donde se realizó la administración anterior.
- Limpie el lugar de la inyección.
- Inyecte Dupixent®:
 - Retire el capuchón verde de la pluma.
 - Coloque la cubierta amarilla de la aguja sobre su piel aproximadamente 90 grados, sujete la pluma precargada de tal forma que pueda ver la ventana.
 - Presione la pluma precargada firmemente contra su piel hasta que no pueda ver la cubierta amarilla de la aguja y manténgala así. Habrá un "clic" cuando comience la inyección y la ventana comenzará a volverse amarilla. La inyección puede tardar hasta 20 segundos.
 - Puede oír un segundo clic. Compruebe que toda la ventana se ha vuelto de color amarillo. Luego cuente lentamente hasta 5. Después levante la pluma de la piel, su inyección está completada.
- Tras la inyección, presione con un algodón o gasa el sitio de inyección durante unos segundos, NO frote.
- Deseche la pluma precargada usada en los contenedores especiales que se entregan para ello.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se ha olvidado una dosis, administrar la misma tan pronto como sea posible. A continuación, siga la dosificación según la pauta establecida. Si tiene dudas, consulte con su médico, farmacéutico o enfermero.

¿Qué efectos adversos más frecuentes pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son un mayor riesgo de infecciones (se pueden manifestar con fiebre, malestar general, problemas dentales, escozor al orinar, tos) y reacciones en el punto de inyección (se pueden manifestar con inflamación, dolor, enrojecimiento y picor).

Avisé a su médico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos y si se ha vacunado recientemente o tiene que vacunarse.

Si a usted se le ha prescrito Dupixent® para el tratamiento del asma, no interrumpa o reduzca sus medicamentos para el asma, a menos que se lo indique su médico.

Advertencias

Conducción y uso de máquinas

Es poco probable que los posibles efectos de Dupixent® afecten a su capacidad para conducir o manejar maquinaria.



Embarazo

Si está embarazada, cree que podría estarlo o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. Se desconocen los efectos de este medicamento en mujeres embarazadas, por lo que es preferible evitar el uso de Dupixent® durante el embarazo, a menos que su médico le aconseje hacerlo.

Lactancia

Si está en periodo de lactancia debe consultar con su médico antes de utilizar Dupixent®. Usted y su médico deben decidir si dará el pecho o utilizará Dupixent®. No debe hacer ambas cosas a la vez.

Excipientes de declaración obligatoria

Arginina hidrocloreto, histidina, polisorbato 80 (E433), acetato de sodio trihidrato, ácido acético glacial (E260), sacarosa y agua para preparaciones inyectables.

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS, POR FAVOR,
DEVUÉLVVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA**