

Rinvoq® (Upadacitinib)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Rinvoq® contiene upadacitinib, un principio activo que actúa reduciendo la actividad de un grupo de enzimas llamadas quinasas, lo que ayuda a reducir la inflamación. Se utiliza para el tratamiento de la artritis reumatoide, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Rinvoq® 15 mg caja de 28 comprimidos en un frasco. Los comprimidos son de liberación prolongada, de color morados, ovalados y biconvexos, grabados con “a15” en una cara.

¿Cómo se debe conservar?

Rinvoq® no requiere condiciones especiales de conservación. Conservar el fresco en el envase original y con la tapa bien cerrada para protegerlo de la humedad. No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja.

¿Cómo se administra?

La dosis recomendada de Rinvoq® es un comprimido de 15 mg una vez al día. Debe tragar el comprimido entero con agua, sin partirlo ni tritularlo, ya que se puede modificar la cantidad de medicamento que entra en su cuerpo. Los comprimidos pueden tomarse con o sin comida.

Si toma más Rinvoq® del que debe, consulte con su médico o farmacéutico.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida una dosis, tómela tan pronto como se acuerde. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Rinvoq® puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufran. El tratamiento con este medicamento puede ocasionar efectos adversos graves como herpes zóster (erupción cutánea dolorosa con ampollas) o neumonía (dificultad para respirar, fiebre, tos y mucosidad). Informe a su médico o busque ayuda médica lo más rápido posible si presenta alguno de estos síntomas.

Otros efectos adversos menos graves pero más frecuentes son: infecciones de garganta y nariz, tos, fiebre, calenturas, náuseas, bajo número de glóbulos blancos en sangre, niveles altos de colesterol, niveles altos de enzimas hepáticas, aumento de peso y acné.

Uso de otros medicamentos

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Rinvoq®. Informe a su médico o farmacéutico si está tomando cualquier otro medicamento, ya que algunos pueden reducir el funcionamiento de Rinvoq® o aumentar el riesgo de aparición de efectos adversos. Informe a su médico o farmacéutico si está tomando:

- medicamentos para tratar las infecciones por hongos (posaconazol o voriconazol) o por bacterias (claritromicina o rifampicina).
- medicamentos para tratar el síndrome de Cushing (ketoconazol).
- medicamentos para tratar las convulsiones o crisis epilépticas (fenitoína).
- medicamentos que afecten a su sistema inmune (azatioprina, ciclosporina o tacrólimus)

INFORMACIÓN AL PACIENTE

Unidad Atención Farmacéutica Pacientes Externos (UFPE)
Servicio Farmacia. Hospital Arnau de Vilanova
Tel: 96 197 60 78
Mail: ufpe_arnau@gva.es


**tu farmacéutico
de guardia**

Advertencias

Conducción y uso de máquinas

Rinvoq® no afecta a la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

Embarazo

Rinvoq® no debe utilizarse durante el embarazo. Informe a su médico si está embarazada o pretende quedarse embarazada.



Lactancia

Si está en periodo de lactancia o tiene previsto dar el pecho, consulte con su médico antes de tomar este medicamento. No debe utilizar Rinvoq® mientras esté dando el pecho, ya que se desconoce si este medicamento pasa a la leche materna. Usted y su médico deben decidir de forma conjunta si dar el pecho o tomar este medicamento.

Excipientes de declaración obligatoria

Manitol.

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS, POR FAVOR,
DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA