
	<p><b>INFORMACIÓN AL PACIENTE</b></p> <p><b>Unidad Atención Farmacéutica Pacientes Externos (UFPE)</b>  <b>Servicio Farmacia. Hospital Arnau de Vilanova</b>  Tel: 96 197 60 78  Mail: ufpe_arnau@gva.es</p>	
---	--	---

## Dovato® (Dolutegravir/Lamivudina)

### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Dovato® es un medicamento que contiene 2 principios activos en un sólo comprimido: dolutegravir y lamivudina. Se utiliza para el **tratar la infección por el virus VIH** en adultos y adolescentes mayores de 12 años.

Este medicamento no cura la infección por el virus, si no que mantiene la cantidad de virus en su cuerpo en nivel bajo.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Dovato® 50 mg/300 mg es un envase de 30 comprimidos recubiertos con película. Los comprimidos son ovalados, blancos con "SV 137" grabado en una cara.



### ¿Cómo se debe conservar?

Dovato® **no requiere condiciones especiales de conservación.**

Mantenga este medicamento fuera de la vista y el alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.

### ¿Cómo se administra?

**La dosis recomendada es un comprimido una vez al día.**

Trague el comprimido entero con o sin alimentos. No mastique, machaque ni parta el comprimido.

**Si está tomando un antiácido**, tómelo al menos 6 horas antes o al menos 2 horas después de tomar Dovato®.

Si está tomando un suplemento vitamínico, tome Dovato® en las comidas.

**Si toma accidentalmente más cantidad** del que debe, debe ponerse en contacto con su médico o servicio de urgencias más cercano para que le asesoren.

No interrumpa el tratamiento con Dovato® sin recomendación de su médico.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si omite una dosis, **calcule cuánto tiempo hace que tomó el último comprimido** de Dovato®:

- Si quedan menos de 4 horas para su próxima dosis, **sáltese esa dosis olvidada** y tome la siguiente a la hora habitual.
- Si quedan más de 4 horas, tome la dosis olvidada tan pronto como sea posible.

Si tiene cualquier duda, consulte con su médico o farmacéutico.



### ¿Qué efectos adversos más frecuentes pueden aparecer durante el tratamiento?

Este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

En pocas ocasiones puede aparecer una reacción alérgica al medicamento conocida como reacción de hipersensibilidad. Se manifiesta con síntomas como: erupción cutánea, fiebre, cansancio, hinchazón de la cara o la boca, dificultad para respirar y dolores musculares. Acuda a un médico rápidamente si presenta alguno de estos síntomas.

Otras reacciones adversas menos graves pero más frecuentes que pueden aparecer son: dolor de cabeza, diarrea, náuseas e insomnio.

Comuníquese a su médico o farmacéutico cualquier síntoma de reacción adversa.

 <p>GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA DEPARTAMENT DE SALUT VALÈNCIA ARNAU DE VILANOVA-LLIRIA</p>	<p><b>INFORMACIÓN AL PACIENTE</b></p> <p><b>Unidad Atención Farmacéutica Pacientes Externos (UFPE)</b>  <b>Servicio Farmacia. Hospital Arnau de Vilanova</b>  Tel: 96 197 60 78  Mail: ufpe_arnau@gva.es</p>	 <p><b>tu farmacéutico de guardia</b></p>
---	--	--

### Uso de otros medicamentos

**Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, especialmente:**

- Metformina, para el tratamiento de la diabetes.
- Antiácidos.
- Suplementos de vitaminas que contengan calcio, hierro o magnesio.
- Medicamentos o alimentos que contengan xilitol, manitol, lactitol o manitol.
- Hierba de San Juan.
- Otros medicamentos para tratar la infección por VIH.
- Medicamentos para tratar infecciones bacterianas y epilepsia.
- Cladribina.
- **Fampridina, para la esclerosis múltiple, está contraindicada.**

### Advertencias

#### Conducción y uso de máquinas

Dovato® puede hacer que se sienta mareado y puede tener otros efectos que reduzcan su atención. No conduzca si aparece algún efecto de este tipo.



#### Embarazo

Si está embarazada, cree que podría estarlo o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. Tomar Dovato® en el momento de quedarse embarazada o durante las primeras 6 semanas de embarazo puede aumentar el riesgo de defectos de nacimiento.



#### Lactancia

Las mujeres VIH positivas no deben dar el pecho a sus hijos porque el virus puede pasar a través de la leche materna.

Una pequeña cantidad de medicamento también puede pasar a la leche materna.

Consulte con su médico ante cualquier duda.

#### Excipientes de declaración obligatoria

Carboximetilalmidón sódico tipo A, fumarato de estearilo y sodio, manitol.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO**  
**Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS, POR FAVOR,  
DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA**