

## Mayzent® (Siponimod)

### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Mayzent® contiene el principio activo siponimod y se utiliza para tratar adultos con esclerosis múltiple secundaria progresiva (EMSP) con enfermedad activa.

Este fármaco ayuda a proteger el sistema nervioso central de los ataques del sistema inmunitario propio del organismo, reduciendo la lesión nerviosa causada por la esclerosis múltiple. Como resultado Mayzent® ayuda a enlentecer el empeoramiento de la discapacidad, las lesiones en el cerebro y los brotes.



### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Mayzent® 0,25 mg comprimidos recubiertos con película, redondos, de color rojo pálido, con el logo de la compañía en una cara y "I" en la otra.

Mayzent® 2 mg comprimidos recubiertos con película, redondos, de color amarillo pálido, con el logo de la compañía en una cara y "II" en la otra.

### ¿Cómo se debe conservar?

Mayzent® no requiere condiciones especiales de conservación.

No conservar a temperatura superior a 25°.

### ¿Cómo se administra?

Este tratamiento tiene una primera pauta de inicio, en la que se va aumentando progresivamente la dosis, y a continuación otra pauta de mantenimiento.

### Pauta de inicio del tratamiento

La finalidad de este periodo de tratamiento es reducir el riesgo de reacciones adversas. Se le dispensará el envase de inicio que contiene 12 comprimidos de 0.25 mg de Mayzent®. La pauta habitual es la siguiente:



Día	Dosis	Nº de comprimidos de Mayzent® 0,25 mg
Día 1	0,25 mg	1 comprimido
Día 2	0,25 mg	1 comprimido
Día 3	0,5 mg	2 comprimidos
Día 4	0,75 mg	3 comprimidos
Día 5	1,25 mg	5 comprimidos

### Pauta de mantenimiento

El día 6 pasará a tomar su dosis de mantenimiento. La pauta habitual son 2 mg al día. Se recomienda tomar los comprimidos por la mañana, con o sin alimentos. Se le dispensará el envase de mantenimiento que contiene 28 comprimidos de 2 mg de Mayzent®.

Su médico podría indicarle que tomara solo 1 mg al día si el análisis de sangre realizado antes de iniciar el tratamiento mostró que su organismo descompone este medicamento más lentamente.

Si ha tomado más comprimidos de los que debe o si por el error el primer comprimido que ha tomado era del envase de mantenimiento en lugar del envase de inicio, hable inmediatamente con su médico. Podría decidir mantenerle en observación.

 <p>GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA</p>  <p>DEPARTAMENT DE SALUT VALÈNCIA ARNAU DE VILANOVA-LLÍRIA</p>	<p><b>INFORMACIÓN AL PACIENTE</b></p> <p><b>Unidad Atención Farmacéutica Pacientes Externos (UFPE)</b>  <b>Servicio Farmacia. Hospital Arnau de Vilanova</b>  Tel: 96 197 60 78  Mail: ufpe_arnau@gva.es</p>	 <p><b>tu farmacéutico de guardia</b></p>
--	--	--

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si durante los primeros 6 días de tratamiento olvida tomar su dosis un día, hable con su médico antes de tomar la siguiente dosis. Le recetará un nuevo envase de ajuste de dosis.

Si olvidó tomar una dosis cuando está en fase de mantenimiento, tómela tan pronto como se dé cuenta de ello, salvo que sea casi la hora de tomar la siguiente dosis.

### ¿Qué efectos adversos más frecuentes pueden aparecer durante el tratamiento?

Este medicamento puede producir algunos efectos adversos graves. Los más frecuentes son: sarpullido tipo herpes zóster, fiebre, dolor de garganta, convulsiones, alteraciones visuales y latido lento del corazón. Si tiene cualquiera de estos síntomas, avise a su médico inmediatamente.

Otros efectos adversos frecuentes pero menos graves asociados a Mayzent® son: dolor de cabeza, presión arterial alta, lunares nuevos o mareo.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico.

### Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluidos aquellos que no necesitan receta para su dispensación o plantas medicinales.

Mayzent® no se debe tomar con ciertos fármacos que actúen sobre el corazón o el sistema inmunitario.

### Advertencias

#### Conducción y uso de máquinas

Su médico le informará de si su enfermedad le permite conducir vehículos y utilizar máquinas de forma segura. No se prevé que Mayzent® afecte a su capacidad de conducir cuando está en tratamiento de mantenimiento, sin embargo, al inicio del tratamiento puede ocasionar mareo.



#### Embarazo

Si está embarazada, cree que podría estarlo o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. Si se utiliza este medicamento durante el embarazo, existe riesgo de causar daño al feto.

Si es una mujer en edad fértil, su médico le informará de este riesgo antes de iniciar el tratamiento y le pedirá que se haga una prueba de embarazo. Debe utilizar un método anticonceptivo durante el tratamiento con Mayzent® y durante al menos los 10 días posteriores a la interrupción del mismo.

#### Lactancia

Durante el tratamiento con Mayzent® no debe dar el pecho. Este fármaco puede pasar a la leche materna y existe riesgo de efectos adversos para el bebé.

#### Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa y lecitina de soja.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO**  
**Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS, POR FAVOR,  
DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA**