

Cosentyx® (Secukinumab)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Secukinumab está indicado para el tratamiento de la psoriasis en placas de moderada a grave, en pacientes con artritis psoriásica y en pacientes con espondilitis anquilosante.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Cosentyx® 150 mg solución inyectable en pluma precargada.
Cosentyx® 300 mg solución inyectable en pluma precargada.

¿Cómo se debe conservar?

Conserve Cosentyx® en la nevera, entre 2°C y 8°C (NUNCA en el congelador).
Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz.

¿Cómo se administra?

Siga las indicaciones de su médico.

Se inyecta bajo la piel (vía subcutánea).

Las zonas de inyección son el abdomen y los muslos.

Se recomienda sacar de la nevera unos 30 minutos antes de administrarse.
Lávese las manos antes de manipular Cosentyx®.



La pluma se presenta lista para administrar, contiene una solución incolora y transparente.
NO AGITE LA PLUMA.

Limpie la zona de inyección con una toallita impregnada de alcohol. Espere a que se evapore el alcohol antes de la inyección.

- Quite la tapa de la pluma.
- Presione con firmeza la pluma contra la piel con un ángulo de 90° para iniciar la inyección.
- Presione el botón de la pluma. Oirá un **1er clic** que indica el inicio de la inyección.
- **Mantenga** la pluma firmemente **presionada** contra la piel. El **indicador verde** le indicará el progreso de la inyección.
- El **2º clic** le indica que la inyección está **a punto** de finalizar.
- Verifique que el **indicador verde** llene la ventana y haya dejado de moverse y retire la pluma.
- Tras la inyección, presione con un algodón o gasa el sitio de inyección durante unos segundos, **NO** frote. Recuerde que la pluma es de un único uso. Deseche la pluma en los contenedores especiales que se le entregan para ello.

Recuerde que la pluma es de un único uso.

Deseche la pluma en los contenedores especiales que se le entregan para ello



 <p>GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA</p>  <p>DEPARTAMENT DE SALUT VALÈNCIA ARNAU DE VILANOVA-LLÍRIA</p>	<p><u>INFORMACIÓN AL PACIENTE</u></p> <p>Unidad Atención Farmacéutica Pacientes Externos (UFPE) Servicio Farmacia. Hospital Arnau de Vilanova Tel: 96 197 60 78 Mail: ufpe_arnau@gva.es</p>	 <p>tu farmacéutico de guardia</p>
--	---	--

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

En caso de que olvide una dosis, adminístrela tan pronto como sea posible. Nunca se administre una dosis doble. Después hable con el médico para que le diga cuándo debe inyectarse la dosis siguiente.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Son frecuentes las reacciones locales en el punto de inyección (enrojecimiento, picor, dolor e inflamación). Existe un mayor riesgo de infecciones de las vías respiratorias altas. Puede aparecer herpes labial, aumento de la mucosidad nasal, diarrea y urticaria.

Avisé a su médico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

Algunas vacunas están contraindicadas durante el tratamiento con Cosentyx®, consulte al médico antes de ser vacunado.

No tome por su cuenta ningún medicamento.

Advertencias



No se recomienda la administración de Cosentyx® durante el embarazo. A las mujeres en edad fértil se les recomienda utilizar un método anticonceptivo adecuado para prevenir el embarazo y continuar su uso durante al menos 20 semanas tras el último tratamiento con Cosentyx®

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS, POR FAVOR,
DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA