

Ajovy® (Fremanezumab) pluma precargada

¿Qué es y para qué se utiliza?

Ajovy® contiene el principio activo fremanezumab. Se utiliza para prevenir la migraña en adultos con al menos 4 días de migraña al mes. Es un anticuerpo monoclonal que se une a una diana específica del organismo, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), que desempeña un papel importante en la migraña.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Ajovy® 225 mg solución inyectable en jeringa precargada. Cada envase contiene una jeringa.

¿Cómo se debe conservar?

Conserve Ajovy® en la nevera, entre 2-8°C (NUNCA en el congelador). Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz.

La pluma precargada de Ajovy® puede sacarse de la nevera y conservarse a una temperatura por debajo de 25°C durante un periodo máximo de 24 horas. El medicamento se debe desechar si ha estado más de 24 horas fuera de la nevera.



¿Cómo se administra?


Debe inyectar el contenido de la pluma de forma subcutánea. Para evitar lesiones en la piel, debe alternar los lugares de inyección (abdomen, muslo, brazos) y evitar la administración en zonas de piel sensible, dañada o con hematomas o cicatrices.



La dosis recomendada son 675 mg (3 inyecciones de 225 mg) cada 3 meses o 225 mg cada mes.

Instrucciones de administración:

- La pluma se presenta lista para administrar, contiene una solución incolora/amarillenta. Saque la pluma de la nevera y déjela reposar a temperatura ambiente (20-25°C) durante 30 minutos antes de administrarla.
- Limpié la zona de inyección con una toallita impregnada de alcohol. Espere a que se evapore el alcohol antes de la inyección.
- Quite la tapa de la pluma
- Presione con firmeza la pluma contra la piel con un ángulo de 90° para iniciar la inyección.
- Oirá un **1er clic** que indica el **inicio de la inyección**.
- Mantenga la pluma firmemente presionada contra la piel. El **indicador azul** le indicará el progreso de la inyección.



- El **2º clic** le indica que la inyección está **a punto de finalizar**.
- Verifique que el **indicador azul** llene la ventana y haya dejado de moverse y retire la pluma.
- Tras la inyección, presione con un algodón o gasa el sitio de inyección durante unos segundos, **NO frote**.
- Recuerde que la pluma es de un único uso. Deseche la pluma en los contenedores especiales que se le entregan para ello.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Debe inyectar la siguiente dosis de Ajoyv® tan pronto como lo recuerde. No se administre una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Si no está seguro de cuándo debe inyectarse este medicamento, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Los efectos adversos más frecuentes son: dolor y enrojecimiento y picor en el lugar de la inyección. Con menos frecuencia puede aparecer una erupción cutánea en el lugar de la inyección, exantema, hinchazón o urticaria (síntomas asociados a una reacción alérgica).

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento

Advertencias

Conducción y uso de máquinas

La influencia de Ajoyv® sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.

Embarazo

Si está embarazada, cree que podría estarlo o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.



Lactancia

Si está en periodo de lactancia o tiene previsto dar el pecho, consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar este medicamento. Usted y su médico deberán decidir si utilizaría Ajoyv® durante la lactancia.

Excipientes de declaración obligatoria

Sacarosa, edetato disódico dihidratado

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS, POR FAVOR,
DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA